


LE VOMISSEMENT DANS LA COQUELUCHE



Le vomissement est un symptôme de la coqueluche, symptôme qui manque souvent il est vrai, mais qui se montre dans un bon nombre de cas, parfaitement simple d'ailleurs, et qui ne paraît pas l'aggraver parce qu'il se produit en définitif à espaces assez éloignés. Il survient, à la fin de la quinte, surtout si cette dernière saisit l'enfant alors qu'il a l'estomac rempli par les aliments. On est porté à l'attribuer aux secousses auxquelles l'estomac se trouve soumis, par le fait qu'il survient à la fin des quintes et qu'en général son apparition, surtout comme complication, ne se voit que dans les coqueluches intenses. J'ai observé aussi d'une manière certaine, dans des familles dont je soignais tous les enfants, que ceux qui avaient l'estomac habituellement moins bon, étaient de petits mangeurs délicats et vomissaient facilement pour la moindre cause, en temps ordinaire, avaient, pendant leur coqueluche, des vomissements bien plus fréquents.

En général, un enfant atteint de coqueluche doit faire des repas légers et répétés, par conséquent plus souvent qu'en temps ordinaire. Pour ceux qui vomissent, il faut donner la préférence aux aliments liquides et en avoir tou-

jours de prêts à leur offrir immédiatement après la quinte qui vient de leur faire rendre ce qu'ils avaient dans l'estomac. Le matin, avant de faire manger ces enfants, il faut attendre qu'ils aient eu plusieurs quintes sous peine de voir leur premier déjeuner complètement rejeté ; dans la journée, il faut les faire manger après qu'ils viennent d'avoir une quinte un peu considérable, dans l'espérance que n'en ayant pas d'autres pendant un certain temps, ils garderont l'aliment qui leur a été donné.

C'est effectivement ce qui a lieu, sauf pour quelques-uns, qui vomissent, même dans l'intervalle des quintes. Certains agents paraissent avoir une action heureuse pour modérer le vomissement, ainsi le café ; aussi est-il bon d'en avoir toujours sous la main, pour en donner une cuillerée à café ou à dessert, aussitôt que l'enfant a pris son repas ou immédiatement avant. Ce café doit être donné très chaud ou glacé. Quand il y a une irritation manifeste de l'estomac, il faut tâtonner, si je puis dire, et essayer de différents agents pour la calmer. Ainsi, une demi-goutte ou une goutte de laudanum dans une cuillerée à café d'eau sucrée, trois ou quatre fois par jour, quelques minutes avant de faire manger. La glace et les eaux chargées d'acide carbonique peuvent aussi rendre des services dans ces cas.

Parmi les aliments qui seront le