collet de la dent nécessitent quelques panséments occlusifs, par exemple, pansément de teinture de benjoin concentrée qui empêche le contact de l'air et de la salive, ou le pansément avec :

Chloroforme.....	} àâ 2 grammes.
Teinture d'opium.....	
Teinture de benjoin.....	

Dans la carie non pénétrante du 2e degré, on peut obturer immédiatement si la dentine est intacte ; mais si l'épaisseur de la dentine est trop faible il faut faire des panséments au benjoin ou avec la mixture ci-dessus, renouvelés tous les deux jours pendant quinze jours ou un mois ; après ces panséments, on fera une obturation définitive.

Les caries pénétrantes sont avec pulpe ou sans pulpe.

Dans la carie dentaire avec pulpe, M. Moreau-Marmont détruit d'abord la pulpe avec une mèche de coton très fine, introduite aussi loin que possible dans la cavité pulpaire, mèche ayant séjourné dans le mélange suivant :

Acide phénique.....	} àâ 2 grammes.
Acide arsénieux.....	
Glycérine neutre.....	

La pulpe doit être détruite totalement, jusque dans les racines. Le traitement demande sept, huit, dix panséments. Pour terminer, il est bon de passer une pointe rougie au feu ou une fine pointe de thermocautère dans la lumière de chaque racine, après quoi on fait deux ou trois panséments d'expectation avec la teinture de benjoin et quand toute trace de sensibilité a disparu, on fait l'obturation.

Dans la carie pénétrante sans pulpe, avec dent sans douleur, on commencera par nettoyer la cavité de la carie et la cavité dentaire puis on y introduira un pansément simple au benjoin.

Mais si la dent est sensible, on emploiera la mixture ci-dessus (chloroforme, teinture d'opium et de benjoin).

En résumé les caries dentaires du 1er et du 2e degré seront, après traitement préalable, obturées définitivement. Dans les caries du 3e degré on se contentera d'une obturation temporaire.

Enfin, on réservera l'extraction pour les cas de périostite suraiguë avec douleurs impossibles à soulager, d'abcès dentaires, d'ouverture cutanée, d'abcès dentaires à répétition, avec névralgie tenace et surtout pour les cas de phlegmon de la face ou du cou consécutif à l'évolution d'une dent de sagesse.—*Paris médical.*

Avortements réitérés; causes et traitement prophylactique.— A l'"Obstetrical Society" de Londres, cette question a été l'objet d'une intéressante discussion. En dehors de l'influence bien connue de la syphilis, Leith Napier a montré le rôle des endométrites,