

ont des rapports directs ou indirects avec le coccyx : releveur de l'anus, ischio-coccygien, coccygien et sphincter anal (Heule). Ces myosites et cellulites peuvent se manifester isolées ou accompagnées d'endométrites et de congestions vaginales vestibulaires. Ces complications sont assez fréquentes. Les symptômes subjectifs varient avec la localisation et le degré variable de l'affection. Une sensation de pesanteur, de pression, de douleur et de cuisson, est principalement perçue dans la région vulvaire ou dans la région anale. Assez souvent, la station assise provoque des douleurs dans la région coccygienne. Ordinairement, la douleur est plus accusée quand la malade se lève sur son séant. La défécation est douloureuse, les selles sont difficiles. Ces symptômes sont identiques à ceux de la coccygodynie, dont les causes sont, d'après les auteurs, des altérations morbides des vertèbres et des articulations coccygiennes. Dans la plupart des cas, rapportés par Carolina Widerström, le coccyx était exempt de points douloureux. Restent à éclaircir les rapports des formes graves de vaginisme avec les myosites et cellulites de l'excavation pelvienne. L'influence du froid est très considérable au point de vue étiologique.

Comme traitement, on recourt au massage bimanuel. L'index d'une main (le gauche pour masser à gauche du coccyx, le droit pour masser à droite) est introduit dans le rectum (exceptionnellement dans le vagin), tandis que l'extrémité de l'autre main s'appuie vis-à-vis sur la face inférieure du bassin. Le massage est pratiqué alternativement à l'intérieur et à l'extérieur. Dans le vagin, il est interdit d'exercer des frottements sur la muqueuse; on doit la déplacer dans les mouvements, en traitant seules les parties sous-jacentes. Tous les cas traités par cette méthode ont guéri.—*Revue de bibliographie médicale.*

Les abcès du sein reconnaissent pour cause unique les fissures du mamelon.—GOODALL.

BARTHOLOW est d'avis que chez les femmes à tempérament nerveux, hystériques et souffrant d'irritabilité vésicale avec envie fréquente d'uriner, il est peu de remèdes aussi efficaces que le gelsemium.

Dans la blennorrhée et la leucorrhée, LUTAUD recommande la formule suivante :

Créoline.....	20 gouttes
Extrait fluide d'hydrasdis.....	2½ drachmes

M.—*Dose* : Deux cuillerées à thé dans une chopine d'eau chaude, en injection.