

PHARMACOLOGIE.

Ipécacuanha

Est incompatible avec les sels de plomb, de mercure et les acides végétaux. A hautes doses, 1 à 2 grammes (15 à 30 grains) agit comme vomitif. A petites doses, 0 gr. 05 centigr. (2 à 10 grains) agit comme expectorant et décongestif: bronchites congestions pulmonaires, hémoptysies rebelle.

1° LAVEMENTS :

Racine d'ipéca amélie 5 grammes.
Eau bouillante.....250 "

2° MIXTURES :

Teinture d'ipéca. }
" de gentiane... } à 15 grammes
" columbo }

XX à XXX gouttes après les repas en deux ou trois fois à $\frac{1}{2}$ heure d'intervalle dans un peu d'eau. (*Dyspepsie nerveuse*).

3° PILULES : (Segon)

(a) Poudre d'ipéca..... 0 gr. 05 centig.
Calomel 0 gr. 02 "
Extrait d'opium 0 gr. 01 "
Miel blanc..... Q. s.

Pour une pilule, 6 à 10 par jour, dans la dysenterie.

(b) Poudre d'ipéca..... 0 gr. 05 centig
" de feuilles de digitale 0 gr. 02 "
Extrait d'opium 0 gr. 025 milligr.

Pour une pilule, 4 à 6 par jour dans troubles cardiaques du goître exophtalmique. — (Dieulafoy).

(c) Poudre d'ipéca..... 0 gr. 05 centig.
Extr. thébaïque..... 0 gr. 005 millig.
Pour une pilule, 3 à 5 dans la congestion pulmonaire grippale.

4° POTIONS :

(a) Infusion de poudre d'ipéca à 0 gr. 30 centigr.
P. 100..... 60 grammes.

(i) Dans la Revue Thérapeutique.

Sirop de capillaire..... 30 grammes.
Benzoate de soude..... 0 gr. 50 cent.

A prendre p. c. à café, en 1, 2 ou 3 jours, suivant l'âge.

(b) Ipéca pulvérisé..... 2 gr. 50 centig.
Julep gommeux.....250 grammes.

Une cuillerée à soupe tous les quatre heures, dans l'hémoptysie.

(c) Ipéca concassé..... 2 grammes.
Eau..... 150 "

Faire bouillir un quart d'heure, passer et ajouter :

Sirop d'opium 30 grammes
Une cuillerée à soupe d'heure en heure, dans la dysenterie.

5° POUDRES :

(a) Ipéca..... }
Calomel } à 0 gr. 05 centig.
Opium pulvérisé..... }

Diviser en 10 paquets, 1 d'heure en heure.

(b) Poudre d'ipéca..... 1 gr. 50 centig.
Tartre stibié 0 gr. 05 "

En 10 paquets à prendre à $\frac{1}{2}$ heure d'intervalle. (Éméto-cathartique).

6° SIROPS :

(a) Sirop d'ipéca..... 30 grammes.
Poudre d'ipéca..... 0 gr. 30 centig.

Une cuillerée à café de 5 en 5 minutes jusqu'à effet vomitif. (1)