

prêter une grande attention, car un examen superficiel peut entraîner des conséquences graves. En effet quand le col est repoussé fortement en haut et en arrière par la tête qui a entraîné en bas le segment inférieur, on sent ce segment inférieur pas plus épais que certaines membranes amniotiques. On touche les fontanelles et les sutures tout aussi bien que s'il n'y avait rien d'interposé entre elles et le doigt. Mais si ce doigt va à la recherche du col en arrière et en haut, très haut quelque fois, il le trouve complètement fermé.

On a vu des médecins appliquer dans ces cas le forceps sur le segment inférieur de l'utérus.

L'an dernier, j'ai rapporté, dans l'Union Médicale, l'observation d'un cas d'oblitération complète du col. Après deux jours de travail le segment inférieur de l'utérus était devenu tellement mince qu'on aurait pu croire la tête fœtale coiffé seulement des membranes qu'on était tenté de déchirer.

Le col n'est pas dilaté parce que les eaux bombent fortement et s'étendent sur une large surface. Je rappellerai en passant, qu'il y a 4 formes de poches des eaux: poche des eaux plate, poche des eaux hémisphériques, poche des eaux en boudin, et poche des eaux en bissac. J'ai vu la poche des eaux dans cette dernière forme remplir complètement le vagin et même faire hernie en dehors de la vulve, quand le col avait à peine la dilatation d'une pièce de 50 cents et que la tête n'était pas encore engagée. Avant donc de parler d'appliquer le forceps il faut nécessairement s'assurer par un bon toucher que le col est dilaté. Allez donc demander à la patiente et aux parents la permission de mettre le forceps quand vous avez une poche des eaux en bissac et qu'au moment de l'appliquer vous vous apercevez que vous avez une présentation du siège ou du plan latéral.

Les conditions *relativement* nécessaires sont les suivantes:

1^o Il faut que le *fœtus se présente par l'extrémité céphalique* première.

Il ne faut pas prendre cette règle dans un sens trop absolu. Car vous verrez dans la pratique qu'il est quelque fois utile et nécessaire d'appliquer le forceps sur la tête dernière et dans des