

# LA CLINIQUE

REVUE MENSUELLE DE MEDECINE ET DE CHIRURGIE

PUBLIÉE A MONTRÉAL

---

---

VOL. VI

JUIN 1900

No. 11

---

---

## Trois cas de grossesse extra-utérine.

PAR

Monsieur le Docteur E. DELAUNAY, Chirurgien-en-chef de l'hôpital Péan.

### I.—*Grossesse extra-utérine tubo-Interstitielle.—Hystérectomie vaginale. Guérison.* (1)

Le 8 février de cette année entrant dans mon service, à l'hôpital Péan, une malade dont voici, brièvement résumée, l'histoire clinique.

Agée de 38 ans, cette femme ne présente rien de particulier dans ses antécédents héréditaires ou personnels.

Ses règles parurent pour la première fois à 13 ans  $\frac{1}{2}$ , et, après avoir été difficiles et douloureuses pendant les premiers mois, se régularisèrent.

En 1883, elle eut un premier accouchement gémellaire. A la suite de cet accouchement les règles devinrent un peu plus abondantes.

En 1885, accouchement, au huitième mois, d'un enfant mort.

En 1886, 3<sup>e</sup> accouchement à terme.

En 1892, fausse couche de 1 mois  $\frac{1}{2}$  suivie d'une forte hémorrhagie.

En 1893, 4<sup>e</sup> accouchement à terme.

En 1896, fausse couche de trois mois.

A partir de cette époque, ses règles restèrent régulières mais devinrent plus abondantes et douloureuses.

Au mois de janvier dernier il y eut, dans ses menstrues, un retard de 15 jours suivi, au moment de leur réapparition, d'une véritable hémorrhagie.

Au mois de février, même retard et même hémorrhagie avec cette particularité que les douleurs furent beaucoup plus vives et se localisèrent plus nettement dans la région annexielle droite.

Lorsque, à son entrée à l'hôpital, nous examinons la malade, nous trouvons un utérus volumineux, mobile, indolore. Les

(1) Communication à la Société d'Obstetique de Paris.