

en croix, et d'autresfois encore l'ouverture est triangulaire. La portion de l'épiderme séparée du reste par la formation des vésicules, est ordinairement enlevée par l'écoulement du sang.

Durant le reste de la semaine, la position des stigmates peut se distinguer par une teinte rougeâtre, et une apparence luisante de la peau, l'épiderme étant intact, sans aucune trace de blessure ni de gerçure, et au dessous, au moyen d'une bonne loupe (grossissant vingt fois), on peut voir la peau dans son état normal.

Quant à la couronne de la tête, il est difficile d'examiner les points saignants, qui sont sous les cheveux, vu que les cheveux se saturant de sang s'entremêlent. Mais cet examen n'offre aucune difficulté sur le front. Au moyen d'une bonne loupe, on peut voir un grand nombre de petites piqûres, de forme triangulaire, comme l'observe le Dr. Lefebvre, ressemblant à une morsure de sangsue, mais si petites, qu'elles sont presque microscopiques. De celles-ci le sang s'échappe en telle quantité, que Louise est obligée de l'essuyer à chaque instant.

Excepté les vendredis, on ne voit aucune trace des points par où s'échappe le sang. Même les vendredis, quand Louise essuyé le sang, la peau paraît à l'œil nu parfaitement intacte. Lors de ma visite le 10 octobre 1873, dans laquelle j'accompagnais des prêtres qui allaient lui porter la sainte communion à la maison, il n'y avait aucune trace de sang, ni apparence de piqûres au front lorsque nous entrâmes dans la chambre ; mais il ne s'était pas encore écoulé deux minutes, que le sang coulait en larges gouttes.

Durant les extases, Louise n'a aucune connaissance de ce qui se passe dans l'ordre matériel autour d'elle. On a profité de la circonstance pour examiner la plaie de son côté. Le sang coule d'un point entre la 5e et la 6e côte. Lorsqu'on l'examina la première fois, le 30 août 1868, la peau était intacte, l'épiderme reposait comme aux blessures du front, de la manière ordinaire sur le derme ; et le sang s'échappait de trois points de l'épiderme, d'environ un centimètre (environ deux-cinquièmes de pouce) de distance l'un de l'autre. Dans trois examens subséquents, on trouva qu'une vésicule s'était aussi formée au côté, et que le sang coulait de la surface du derme même qui était laissé nu par le déchirement de l'épiderme. Comme pour les mains et les pieds, la surface du derme était parfaitement intacte et sans aucune gerçure.