

au détroit Nootka, pendant le troisième voyage du capitaine Cook. (*Richardson.*) Elle se voit dans la Colombie-Britannique. (*Lord.*) Elle est très commune au creek Seymour, dans le parc Stanley, et sur l'île Lulu, Colombie-Britannique. (*E. F. G. White.*) On la voit en nombre comme oiseau migrateur au printemps et à l'automne, et on l'a notée en train de couvrir dans le mont Lehmen. (*Streater.*) Elle est commune à l'ouest de la chaîne du littoral, où elle se trouve en partie comme oiseau migrateur. (*Fannin.*) Cette espèce habite Chilliwack. (*Brooks.*) Elle abonde le long du littoral de la Colombie-Britannique, mais elle ne s'y restreint nullement, on la trouve à des altitudes élevées dans toutes les montagnes de l'intérieur jusqu'aux sommets des Montagnes Rocheuses. (*Rhoads.*) Elle est assez commune dans les bois plus profonds à Sitka, Alaska, où, le 2 juillet, on en a pris les premiers jeunes à peine emplumés. (*Grinnell.*) De temps en temps on la voit ou l'entend à Malett, îles Queen Charlotte. Le révérend Keen l'a remarquée à cet endroit. Elle n'abonde pas au goulet Cook, Alaska, où on en a vu et entendu des spécimens çà et là. (*Osgood.*) Le 17 septembre 1901 on en a noté deux spécimens à Homer, sur la péninsule Kenai, Alaska. (*Figgins.*) On en a pris un mâle adulte ainsi que deux femelles à Seldovia, Alaska. (*Anderson.*) On a constaté que la grive variée abondait pendant l'été dans la vallée de la Kowak, au détroit Kotzebue, et on l'a observée dans toutes les étendues d'épinettes blanches que l'on ait visitées. En 1898 elle y est restée en grand nombre jusqu'à la fin août. (*Grinnell.*)

Au mois de mai 1826 on s'est procuré un spécimen de cette espèce à Fort Franklin, latitude $65\frac{1}{2}^{\circ}$, et c'est le seul que l'on ait observé. (*Richardson.*) D'après mes observations personnelles cette grive passe l'été régulièrement, et en assez grand nombre, dans toutes les parties agréables de l'Alaska septentrional même jusqu'en dedans du cercle arctique, et, sans doute, elle se répand aussi loin au nord que le merle ordinaire. (*Nelson.*) Le 4 septembre 1876 on a obtenu, à Fort Yukon, Alaska, un spécimen de cette espèce, mais cette dernière ne s'y voit jamais en grand nombre. Le 27 mai 1877, à St-Michael, l'on m'en a apporté un sixième spécimen qui avait été tué par un indigène. Cette grive ne se voit qu'accidentellement le long de la côte. (*Turner.*)

NOTES SUR LA REPRODUCTION.—J'ai en ma possession un nid ainsi que quatre œufs, recueillis par le révérend Stringer dans le chenal