remplit un but réfrigérateur qui a beaucoup d'importance, car la volatilisation s'établit juste dans la proportion de l'augmentation de chaleur qui se manifeste pendant le travail morbide et en prévient dans une juste proportion tout excès. Le camphre remplit ainsi l'indication qui sert de base à la méthode de Guyot.

La forme, sous laquelle le pansement portugais se fait, remplit encore, selon M. Senna, un but non moins important. Il place une plaie superficielle dans les conditions plus favorables d'une plaie sous-cutanée, car tout en la couvrant et l'abritant des influences atmosphériques, la propriété de volatilisation du camphre supplée l'évaporation constante qui s'observe à la surface de la peau.

La preuve la plus éloquente en faveur de la méthode de Coïmbre se déduit de la statistique des principales opérations pratiquées à l'hôpital de l'Université dans ces huit dernières années.

Voici, d'ailleurs, les données qu'elle nous fournit :

Amputations de la cuisse : mortalité—25 %

Amputations de la jambe : Mortalité—22,2 %

Amputations de la cuisse, de la jambe, du bras, de l'avant-bras, du pied et de la main :

Mortalité—15,6 %

En comparant notre statistique avec celle que nous fournit M. Guérin, de 61 amputations de membres, l'avantage est de beaucoup en notre faveur.

Statistique de Guérin : Mortalité—43,2 %

Statistique de l'Hôpital de Coïmbre : Mortalité—15,6 %

Ce qui nous donne une différence favorable de 27,6 %, chiffre dont l'importance est capitale.

Faisons observer de plus que notre statistique spéciale d'amputations de la cuisse, opérations dont l'extrême gravité ne peut être méconnue, offre encore, comparée avec le chiffre total de Guérin, un avantage de 18,2 %.

La dernière statistique présentée par l'éminent chirurgien de Lisbonne, M. Barbosa, à l'Académie Royale des Sciences, dans un discours qui a été traduit en français par le docteur Bertherand, quoique légèrement inférieure à la nôtre, est toutefois beaucoup au-dessus encore de celle de M. Guérin. Dans cette statistique, le pourcentage est de 16,1, et ce résultat et celui qu'exprime notre comput affirme éloquemment que la pratique usitée en Portugal (les méthodes de traitement à Lisbonne et à Coïmbre sont à peu près semblables) dans le pansement des plaies, n'a rien à demander aux pratiques les plus prônées à l'étranger.