

Il ne donne origine à aucun symptôme désagréable; les malades, au contraire, se trouvent en peu de temps soulagés.

Il ne faut obstruer qu'un côté à la fois, et l'autre vingt-quatre heures après que le premier a été vidé.

L'auteur a obtenu d'excellents résultats en très peu de temps chez quinze patients qu'il avait traités suivant cette méthode.—*Berl. clin. Woch.*—*Maryl. Med. Journ.*

Traitement des ulcères.

La méthode de traitement le plus efficace à l'Hôpital de New-York pour le traitement des ulcères (*N.-Y. Med. Journ.*) est une combinaison de la méthode de Lister conjointement avec le bandage élastique de Martin. On lave d'abord l'ulcère avec une solution d'acide carbolique 1-20, qu'on recouvre ensuite d'un morceau de soie huilée protectrice, sur lequel on place une ou deux compresses de charpie ou de papier feutré, préalablement imbibé d'une solution saturée d'acide boracique. On recouvre le tout d'un bandage élastique qu'on ne change que lorsqu'il est souillé par la suppuration. On se trouve quelquefois mieux d'enlever le bandage élastique le soir, mais non les autres pièces du pansement, qu'on recouvre alors d'un morceau de tissu imperméable, comme de la gutta-percha mince ou du papier ciré retenu *en place* par un bandage ordinaire. Dans les ulcères gangréneux on applique une couche d'iodoforme avant de replacer la soie protectrice. On s'est aperçu que la rapidité de la guérison par ce mode de traitement était beaucoup plus considérable que, lorsqu'on ne se servait que du pansement de Lister ou du bandage élastique.—*Canada Lancet.*
