

que le corps, articles 3, 4 et 5 égaux en longueur. Thorax avec le lobe antérieur en dessus, une large tache sur le disque de chacun des lobes latéraux, une tache à la base de l'écusson avec son extrémité, les deux quelquefois confluentes ou obsolètes, le fond des sillons transversaux du métathorax, la poitrine entière entre les pattes intermédiaires et les antérieures, quelquefois deux taches seulement, noir brillant. Abdomen quelquefois avec les segments 1 et 2 marginés de brun postérieurement. Valves de la tarière noires à l'extrémité. Pattes d'un jaune miel brillant; toutes les hanches et les trochantins blanchâtres; l'extrémité des jambes postérieures avec leurs tarsi, noir brun. Ailes claires, nervures et stigma, noir brun, le dernier marqué, aussi bien que le costa, de jaune sale.




Fig. 7.

♂—Longueur .22 pouce. Diffère de la ♀ en ce que les antennes ne sont pas teintées de roux en dessous. Thorax noir avec le collier et les écailles alaires jaunes. Abdomen noir en dessus, le segment terminale, les côtés plus ou moins, et le ventre entièrement, jaune miel.

Dans l'un et l'autre sexe, il n'est pas rare de rencontrer des individus avec quelques unes des nervures qui divisent les cellules sous-marginales manquantes.

Cette année, c'est le 3 Juin que nous avons vu, ici au CapRouge, les premières Nématodes. Nous avons pu saisir une femelle et 8 mâles sur un seul pied de groseillier. La femelle attachée au dessous d'une feuille, avait commencé à y déposer ses œufs. Comme nous cherchions dans le sol, à l'endroit même, dans l'espoir d'y trouver quelques individus nouvellement éclos ou sur le point de le faire, nous surprîmes un petit Taupin, *Cryptohypnus abbreviatus*, en frais