

produit saignent abondamment. Plusieurs ligatures sont appliquées sans résultat ; il nous faut finalement enlever toute l'annexe pour contrôler l'hémorragie.

Je laissai un drainage fait d'un tube et de deux mèches de gaze.

A l'oeil nu la trompe enlevée ne présente aucune irrégularité, aucune lésion, elle est normale dans toute son étendue. Les franges seules du pavillon dont j'ai déjà parlé étaient disparues. Nous avons séance tenante éti-queté cette grossesse pelvi-péritonéale. C'est la première que je voyais ; toutes les grossesses ectopiques que j'ai eu l'occasion d'opérer siégeaient dans la trompe, et celle-ci portait des marques toujours visibles et tangibles du siège de la grossesse.

Quelques auteurs nient l'existence de cette grossesse comme primitive. D'après eux elle se développe d'abord dans la trompe, puis celle-ci se rupture et l'œuf peut se greffer sur le péritoine où son évolution se continue plus ou moins longue. Ou bien la trompe l'évacue par son ouverture abdominale. C'est l'avortement tubaire et dans ce cas elle peut se greffer encore pour survivre un certain temps.

Il ne nous est pas possible d'affirmer dans notre cas si la grossesse a été primitivement tubaire ou péritonéale. Mais le fait que macrocopiquement la trompe ne présentait rien d'anormal nous incline à croire qu'elle était primitivement péritonéale. Il faudrait, qu'un avortement, s'il a eu lieu, se fut passé dans les toutes premières semaines. Un examen microscopique de la muqueuse tubaire aurait permis une affirmation catégorique, mais nous n'y avons pas pensé. Une rupture de la trompe avec sortie du kyste foetal et sa greffe sur le péritoine aurait fatalement laissé des cicatrices apparentes qui n'existaient pas.

Malgré la rareté du cas, nous persistons à la classer parmi les grossesses pelvi-péritonéales ; et j'aimerais à connaître si mes collègues en ont déjà observé de semblables et dans quelle proportion relative aux grossesses tubaires.

Dr Albert Paquet.

Québec, le 15 décembre, 1922.

**INFECTIONS ET TOUTES
SEPTICEMIES**

(Académie des Sciences et Société
des Hôpitaux du 22 décembre
1911.)

...LABORATOIRE COUTURIEUX....
18, Avenue Hoche, Paris.

Traitement LANTOL
— PAR LE —

Rhodium B. Colloïdal
électrique

AMPOULES DE 3 C'M.