poids du corps, on applique le bandage Sayre. Par ce moyen les surfaces malades sont forcément séparées et le poids de la tête et des épaules étant enlevé de la colonne vertébrale, le patient peut jouir de l'air et du soleil, ces deux facteurs si importants dans le traitement des maladies strumeuses. Mais je voudrais plutôt, vous parler d'une courbure du rachis tout à fait différente de celle-ci, et dans laquelle il n'y a aucune maladie de structure soit des os soit des cartilages. Il y a seulement faiblesse des ligaments et des muscles d'un côté, de façon que la partie supérieure de la colonne vertébrale tombe d'un côté ou de l'autre. C'est ce qu'on appelle courbure latérale. L'accroissement de poids d'un côté comprime le cartilages inter articulaires qui sont très élastiques ce qui augmente encore la difformité. Dans le traitement de cette affection pour laquelle nous sommes si souvent consultés par les mères anxieuses, surtout dans la haute classe, quelques-uns des meilleurs chirurgiens anglais ont entièrement abandonné l'usage de ces horribles instruments de torture inventés dans l'intérêt des fabricants d'instruments, comme étant non-seulement inutiles mais encore positivement nuisibles. Ils recommandent au contraire la position horizontale pendant deux ou trois heures par jour, ainsi que pendant toute la nuit, l'oreiller étant enlevé de dessous la tête et placé sous le bras du côté vers lequel se dirige la convexité de la courbure. Le poids de la tête agit ainsi à la façon d'un levier et l'oreiller comme point d'appui. Les muscles du côté faible ou convexe doivent être stimulés par des frictions à l'eau salée ou par l'électricité. Lorsque le patient n'est pas dans la position ci-dessus indiquée il doit sortir à l'air libre et prendre quelque exercice actif.

Un autre cas dans laquelle la position a pris la place des appareils chirurgicaux, est la fracture de la clavicule. Le fait est que quand un homme est couché sur le dos, l'épaule tombe en arrière; de plus, le poids du bras étant enlevé, l'épaule remonte. J'étais un peu surpris de voir dans quelques hôpitaux de Londres que le seul traitement de ces fractures pendant les 7 ou 10 premiers jours, était de donner une injection hypodermique de morphine, et de mettre le malade sur le dos dans son lit, en donnant des ordres pour qu'il gardât cette position autant que possible. Après que le col s'était formé on appliquait le bandage ordinaire et on laissait le malade se promener.

Dans le traitement de l'orchite et de l'épididymite, qu'elles soient blenorragiques ou non, il est de la plus haute importance non seulement de garder le malade au lit, mais encore de tenir le testicule élevé au moyen d'un oreiller placé entre les jambes. Vous vous rappelez sans doute que les veines