que la gerbe atteigne les pucerons sous les feuilles où ils se rassemblent,

3° Le professeur J. B. Smith recommande très fortement contre toute espèce de pucerons le savon à l'huile de baleine, 1 livre par 8 gallons d'eau.

29. VER DU CHOU (Cabbage Maggot, Anthomyia brassicæ, Bouché).

—Un ou plusieurs vers attaquent les racines des plants de choux qu'on vient de repiquer. Ils éclosent d'œufs que pondent de petites mouches grises, d'un tiers plus petites que les mouches domestiques.

Remèdes.—1° Il'ellébore blanc, 2 onces par seau d'eau ou 2° l'émulsion de pétrole (remèdes II et III), dont on asperge le sol autour des racines, et des binages fréquents remuant la terre jusque contre la tige, sont des remèdes reconnus; 3° on préconise aussi le nitrate de soude, une cuillerée à bouche autour de chaque plant.

ITROUILLES, CONCOMBRES, MELONS.

٠. le

ran-

tête

3 de

rme

sent

bris

, se

raît

ır la

lane

ures

ES

fly,

ons

 $_{
m hes}$

les

les

ute

ou-

แล-

ne,

les

si

es

as m

e

30. Punaise de la citrouille. (Squash Bug, Anasa tristis, De Geer).—Grosses punaises à odeur désagréable, brun foncé, plus pâles en dessous, de 3/3 de pouce de longueur qui se massent autour des tiges de citrouille vers la fin de juin et sucent les pointes. Les œufs sont déposés sur les feuilles, et les jeunes punaises se montrent au milieu des adultes.

Remèdes.—On s'en débarrasse en général en ramas-Fig. 21. sant les insectes à la main dès qu'on les remarque et en plaçant près des plantes des bardeaux sous lesquels ils se cachent durant le jour. Du pétrole et du plâtre répandus entre les branches des plantes en chasse un grand nombre.

31. Altise du concombre (Cucumber Flea-beetle, Epitrix cucu meris, Harris).—Très petites altises noires à pattes et antennes jaunes, couvertes d'une courte pubescence soyeuse, qui percent des quantité de trous dans les feuilles des concombres, pommes de terres, etc., etc.

Remède.—On s'en débarrasse facilement en saupoudrant les plantes d'un mélange de vert de Paris et de fleur de farine au cinquantième (remè le I), il faut le faire quand les plantes sont humides de rosée.

32. Barbeau Barré du concombre (Striped Cucumber Beetle, Diabrotica vittata, Fab.)—Dès que les courges, les concombres et