

L'usage du laudanum est indispensable le premier jour. La température des lavements sera de 38°.

Les lavements seront portés un peu haut dans l'intestin avec une sonde souple et introduits très lentement.

Combien de temps devra-t-on poursuivre l'alimentation rectale exclusive ?

Il est impossible de répondre à cette question. Quand les lavements alimentaires sont mal tolérés, il ne faut pas s'obstiner non plus si la dénutrition est très rapide, s'il y a des tendances syncopales, des troubles nerveux excessifs, un abaissement exagéré de la tension sanguine, si la quantité quotidienne d'urine s'abaisse au-dessous de 400 grammes.

En général, il n'y a aucun inconvénient à continuer la cure une semaine. Au delà, il faut user de précaution et ne poursuivre le traitement que si la diminution quotidienne du poids est médiocre, si l'état général se maintient bon, si la quantité d'urée de l'urine va en diminuant ou reste stationnaire.

La cure de diète stomacale est utile tant que l'ulcère n'est pas cicatrisé, c'est-à-dire longtemps, et seuls les inconvénients résultant de la dénutrition doivent engager à l'interrompre.

La plupart des auteurs ont fixé entre cinq et dix jours la durée de l'alimentation rectale exclusive. Sous la réserve que cette durée n'est en réalité déterminable que dans chaque cas particulier, on peut accepter cette formule.

L'alimentation devra être reprise très progressivement. Les malades, d'ailleurs, n'ont pas faim. On ne cessera les lavements alimentaires que quand la quantité d'aliments prise par la bouche sera suffisante à entretenir la vie. On commencera par donner par petites portions de l'eau pure, non alcaline, à la température de la chambre, ou une infusion un peu de sucre, ou de lactose, si le sujet redoute la saveur trop sucrée.

Le lendemain viendra le lait, qui, chez le plus grand nombre des malades, est très bien toléré.