

taches brunes lancéolées sur la gorge; pennes caudales rousses, les extérieures terminées de blanc; pieds bruns; iris d'un jaune doré.

E. et RR. Cette Grive qui est assez commune dans Ontario, doit probablement aussi visiter quelquefois Québec; elle niche dans des arbustes et pond de 3 à 5 œufs verdâtres ou d'un blanc sale.

### 3 Gen. GALEOSOPTES, *Cabanis*.

Bec un peu large à la base, plus court que la tête; secondaires bien développées; 4e et 5e primaires les plus longues; la 1ère dépassant un peu la moitié de la 2e en longueur; queue arrondie; tarses portant environ 7 écailles.

Ce genre avec le précédent ont été joints au genre *Mimus* pour former la famille des Moqueurs, *Miminae*; tel que ci-dessus défini, il se borne à l'espèce suivante:

**La Grive Catbird.** *Galeoscoptes Carolinensis*, Cabanis, *Muscicapa*, Carol. Linn. *Orpheus Carolinensis*, Aud. *Orpheus felivox*, Sw. *Mimus Carolinensis*, Gray. *Turdus lividus*, Wilson. — Vulg. *Chat*; Angl. *The Cat-Bird*.—Longueur  $8\frac{3}{4}$ ; ailes  $3\frac{3}{4}$ ; queue 4; tarses  $1\frac{1}{4}$  pouces. Couleur générale gris cendré, plus sombre sur les ailes et la poitrine et plus claire sur la gorge et le ventre; front et dessus de la tête noirâtres de même que le bec et l'iris: couvertures inférieures de la queue d'un brun roussâtre. La femelle est un peu plus petite.

E. et R. Cette Grive est à peu près inconnu dans les environs de Québec; mais nous l'avons fréquemment rencontrée à Nicolet et à Bécancour. Tous les enfants là connaissent ses miaulements qui lui ont valu le nom de *Chat* qu'elle porte communément. Quoique à un moindre degré que le Moqueur de Virginie, elle imite assez exactement le cri de plusieurs autres oiseaux. Elle se tient d'ordinaire dans les taillis épais, où elle construit aussi son nid; elle pond de 4 à 5 œufs d'un vert d'émeraude.

## II. Famille des LANIIDES. *Laniidae*.

Bec fort et comprimé, recourbé à l'extrémité, avec les 2 mandibules échancrées, et la supérieure portant une dent; tarses fortement écailleux; primaires 10, la première de la moitié de la seconde en longueur.

Cette famille, dans notre faune, ne comprend que deux