

*Tænia à quatre lobes, Tænia quadriloba.*

Lancéolé; les articulations très-courtes; la tête tétragone, tronquée; deux petits lobes de chaque côté du cou.

*Muller*, Zool. Dan. 3. tab. 110. fig. 2, 3. *Pallas*. Beytr. 1. tab. 3. fig. 21, 24. Encyclopédie, pl. 43. fig. 9, 10, 11.

Se trouve dans les intestins des chevaux.

*Tænia de la chèvre, Tænia caprina.*

Cylindrique, conique; les articulations très-courtes, quatre stigmates latéraux.

*Muller*, Zool. Dan. 3. tab. 110. fig. 4, 5.

Se trouve sur la superficie du foie de la chèvre.

*Tænia du perroquet, Tænia psittaci.*

Filiforme; les articulations très-courtes; la tête extrêmement petite.

Se trouve très-abondamment dans les intestins des perroquets.

*Tænia de la corneille, Tænia cornicis.*

Les articulations antérieures infundibuliformes; les postérieures elliptiques.

*Goeze*, Eingew. tab. 23. fig. 7.

Se trouve dans les intestins de la corneille.

*Tænia serpentiforme, Tæn. serpentiformis.*

La tête plus grosse à son extrémité; la base plus large; les articulations cunéiformes, dilatées, courtes.

*Pallas*, Beytr. 1. tab. 3. fig. 29, 30. *Goeze*. Eingew. tab. 31. fig. 7 à 13.

Se trouve dans les oiseaux du genre du corbeau, du pic, du vaneau, de la grive, et du moineau.

*Tænia cratériforme, Tænia crateriformis.*

Les articulations en forme d'entonnoir; le cou très-