

mouvement flexueux, plus lent, et par ses articulations plus visibles.

5e **Vibrion serpent.** *Vibrio serpens*, Müller.

Corps très allongé, filiforme, ondulé, suivant une direction, le plus souvent rectiligne, ayant 10 à 15 inflexions à angle obtus. Longueur 0,023 à 0,026. Épaisseur, 0,0007. Fréquent dans les infusions animales putrides.

Il ressemble à une ligne très longue relativement à son épaisseur, serpentant à inflexions égales et lâches.

6e **Vibrion baguette.** *Vibrio bacillus*, Müller.

Corps transparent, filiforme, rectiligne, égal, à articulations fort longues, n'ayant que des mouvements d'inflexion peu sensibles, pendant qu'il s'avance lentement dans le liquide et indifféremment en avant ou en arrière; paraissant souvent brisé à chaque articulation. Longueur d'un seul article 0,003 à 0,008, longueur totale jusqu'à 0,033; épaisseur de 0,0007 à 0,0010. Cette espèce se rencontre avec d'autres infusoires dans la matière blanche pulpeuse, qui s'amasse entre les dents qui sont mal entretenues. Les vieilles infusions végétales, entre autres celles de foin, en produisent beaucoup.

7e. **Vibrion lactique,** Pasteur.

Articles presque globuleux, très courts, un peu renflés aux extrémités; longueur d'un seul article 0,0016; d'une série, 0,05 environ. On le rencontre dans le lait altéré.

8e **Vibrion jaunâtre.** *Vibrio synxanthus*, Ehr.

Corps cylindrique, peu flexueux, formé de corpuscules dépassant rarement le nombre de cinq; longueur de chaque corpuscule 0,00073 à 0,00109. On le trouve dans le lait de vache altéré, auquel il donne une coloration jaune.

9e. **Vibrion bleuâtre.** *Vibrio syncyanus*, Ehr.

Analogue au précédent. Dans le lait de vache aigri, auquel il donne une coloration bleue.