

Dans une troisième catégorie, l'étranglement est complet; toute la circulation sanguine est arrêtée et laisse une masse de tissus sans nutrition. Ainsi privées de vitalité, les parois kystiques ne tardent pas à se mortifier, à se sphaceler, elles déterminent une irritation péritonéale redoutable, tant par ses résultats immédiats que par les difficultés opératoires qu'elles présentent au chirurgien, au moment de l'intervention.

Comme conséquence de toute une série de symptômes: douleurs vives, subites, tension et sensibilité du ventre, vomissements, élévation de température, hémorrhagie internes, qui se retrouvent avec d'autres lésions abdominales, le diagnostic de cette complication des kystes ovariens peut présenter quelques difficultés. Les accidents qui accompagneraient la tension du pédicule d'un petit kyste développé du côté droit pourraient bien, en effet, nous faire croire à une appendicite, par exemple.

Comment dès lors écarter de son esprit le soupçon d'une grossesse tubaire rupturée avec le tableau clinique que nous fournirait un kyste dermoïde logé dans le cul-de-sac postérieur, après une torsion complète de son pédicule? Il importe donc de ne pas oublier la possibilité de cet accident et de ne pas le perdre de vue quand on est appelé à examiner une malade présentant quelques-uns des symptômes plus haut énumérés.

Il nous est permis de conclure que la torsion du pédicule des kystes ovariens est une complication grave qu'il faut savoir reconnaître de bonne heure afin d'y apporter immédiatement un traitement efficace. Le traitement ici sera toujours chirurgical: l'extirpation par laparatomie.

L'observation de deux malades que dernièrement j'ai traitées à l'Hôpital peut se résumer comme suit:

Mme B., âgée de 50 ans, veuve, mère de 13 enfants; les règles, qui durent encore, ont débuté au cours de sa treizième année. Santé antérieure à son dernier accouchement, qui date de trois ans, très bonne. A la suite de sa dernière couche, la malade éprouve une vive douleur dans le côté droit, elle constate la présence d'une petite tumeur dure et lisse, sensible au toucher. De ce moment, la malade est restée avec des douleurs de ce côté, des "tiraillements" dit-elle, ces sensations pén-