

taxis à répétition, en ce qu'elle détruit le tissu qui saigne, arrête assez rarement l'hémorragie, car il est souvent difficile de ne pas détacher l'escharre en retirant le cautère.

5. Elévation du bras correspondant à la narine qui saigne — ouate de penghawar — faire asseoir le malade les pieds plongés dans un grand sceau d'eau aussi chaude que possible (Hutchinson) : à l'intérieur, eau de Rabel, quinine, si on soupçonne l'implaudisme, vésicatoire hépatique (Verneuil), etc.

Nous allons maintenant indiquer la thérapeutique véritablement pathogénique qui répond au second desideratum, c'est-à-dire dont le but est d'éviter la récidive, le retour de l'hémorragie.

Assez souvent, on se trouvera bien d'un traitement général approprié, basé sur la constitution du malade et les causes provoquantes possibles : sirop iodo-tannique, un vésicatoire hépatique s'il y a lésion du foie, le rétablissement de la menstruation dans l'épistaxis supplémentaire, enfin les hémostatiques généraux proprement dits, ergotine, hamamelis virginica, hydrastis canadensis, que l'on pourra formuler de la façon suivante :

Teinture d'hamamelis..... } à 4 gr  
— d'hydrastis ..... }  
XV gouttes matin et soir pendant quinze jours et

Ergotine..... 8 gr.  
Sirop d'écorces d'oranges..... 200 —

une cuillerée à soupe le matin pendant la semaine suivante, en alternant ainsi après huit jours de repos.

Quant aux interventions locales, elles sont bien plus précises, plus importantes et dans la plupart des cas même suffisent à elles seules à prévenir les récidives, en faisant disparaître la cause immédiate de l'hémorragie. Sans doute, il faut, autant que possible, faire un diagnostic précis avec le rhinoscope et examiner soigneusement les fosses nasales, mais il est bon de rappeler qu'ici encore le siège de la lésion, en général, est le tiers antéro-inférieur de la cloison du nez. On y trouvera des vaisseaux dilatés, une muqueuse congestionnée, exulcérée et recouverte de croutelettes. Voici alors le traitement que nous conseillons à nos malades.

Vaseline.....	25 gr.
Iodol.....	1 —
Tannin.....	0.80

Mélanger s. a.

De plus, deux fois par semaine, faire soi-même un attouchement sur la cloison avec une solution aqueuse de nitrate d'argent à 1 p. 40 ou 1 p. 30. Il est rare qu'on soit obligé d'en venir à des moyens plus énergiques.