

une anesthésie plus complète l'on pourrait répéter cette deuxième injection deux heures plus tard. Enfin pour les grandes opérations, telles que amputations de membres etc., l'on devra, à moins de contre-indications, donner une troisième injection hypodermique, une heure après la seconde. Enfin le meilleur temps d'opérer, est environ une heure après la dernière injection. Durant l'opération, évitez le bruit autour du malade, ne lui faites pas subir de mouvements brusques, car alors tout en demeurant inconscient, le malade pourrait sembler s'éveiller; il fait un effort pour ouvrir les yeux comme quelqu'un accablé de sommeil ou de fatigue, l'on dirait qu'il cherche à comprendre; mais il suffit alors de lui recommander de dormir et presque toujours le sommeil le reprend. Je suis porté à croire, d'après ces observations que la scopolamine agit beaucoup plus sur le centre nerveux, sensitif, que sur le centre nerveux supérieur. Mais jamais, même lorsque l'opéré semble bien éveillé, jamais il ne conserve la mémoire de ce qui s'est passé pendant l'opération. Après un sommeil calme, de quatre, six, douze heures, le malade s'éveille pour demander un peu d'eau, change de position, puis se rendort pour aussi longtemps. Si alors vous le questionnez sur ses sensations, il vous répond invariablement; "je ne ressens aucune douleur, je suis parfaitement bien," seulement j'ai la bouche sèche je voudrais boire.

(A suivre.)

RÉSULTATS TRÈS SATISFAISANTS.

J'affirme le fait, que j'ai ordonné le SANMETTO plusieurs fois et qu'il m'a donné des résultats très satisfaisants.

St. Louis, Mo.

DR. A. A. HENSKE,
Diplômé en 1875, etc.