

Délire sénile.

Potion avec :

Acétate de zinc.....	gr. x
Eau distillée.....	℥ ij
Sirop S.....	℥ j

M. Par cuillerée à bouche jusqu'à production de nausées ;
dans ce cas, suspendre la potion ou la mélanger aux aliments.

(SEMMOLA).

Gale.

Liniment avec :

Styrax liquide.....	℥ j
Alcool rectifié.....	℥ ij
Huile d'olive.....	℥ j

M. Enduire de ce liniment les parties où l'on soupçonne
l'acare.

(KUNZE).

Gastralgie.

Potion avec :

Acétate ou chlorhydrate de morphine.....	gr. ij
Sucre blanc.....	℥ j
Eau distillée.....	℥ jss

M. Une cuillerée à café au moment des douleurs, et de dix
en dix minutes, jusqu'à cessation de la crise (1).

(OROSI).

Dyspepsie.

Pepsine pure.....	℥ j
Acide lactique	gr. xv
Eau de foinaine.....	℥ ij

M. Une cuillerée à bouche au moment des repas.

(SEMMOLA).

(1) Nous préférons la formule suivante qui nous a toujours donné d'ex-
cellents résultats :

Sirop de morphine.....	℥ j
Sirop d'éther.....	℥ j
Sirop d'écorce d'oranges amères.....	℥ vi

A prendre comme ci-dessus, par cuillerées à café.

H.