

Les symptômes de la péritonite généralisée apparaissent du deuxième au sixième jour des suites de couches. Ils s'annoncent par un frisson violent, à la suite duquel la température s'élève à 40 ou 41° et le pouls monte à 120. La péritonite, une fois établie, présente une symptomatologie qui ne diffère guère de la péritonite ordinaire commune, cependant quelques particularités l'en distinguent: la diarrhée est fréquente; le météorisme est excessif, favorisé qu'il est par le relâchement de la paroi abdominale. La sécrétion lactée ne s'établit point, ou se tarit; les lochies se suspendent ou diminuent d'abondance et deviennent fétides.

La mort survient en sept ou huit jours.

Dans la *septicémie péritonéale suraiguë*, l'infection est particulièrement virulente. Le péritonite survient rapidement, le lendemain de l'accouchement. En quelques heures toute la séreuse abdominale est prise; la maladie se juge en quelques jours, (2 ou 3) même plus rapidement (24 heures). C'est la forme foudroyante.

La *péritonite purulente subaiguë* peut rester méconnue pendant plusieurs jours. Comme symptômes on trouve les signes habituels de l'infection utérine, une douleur plus ou moins prononcée à l'abdomen, peu de météorisme. Les vomissements sont rares et tardifs, la température oscille entre 39 et 40°. Peu à peu l'état général s'altère, le ballonnement du ventre augmente; il y a constipation opiniâtre. Au bout de 10 à 12 jours après des alternatives de mieux et de pire la femme succombe en hypothermie.

On peut même rencontrer une forme *silencieuse* de péritonite où tout signe local fait défaut. Le diagnostic de péritonite n'est alors qu'une trouvaille d'autopsie.

La *péritonite localisée* ou *pelvi-péritonite* peut succéder aux lésions de la trompe ou en être complètement indépendante. Ici la péritonite débute comme la péritonite généralisée, mais les symptômes généraux et locaux s'amendent bientôt et la maladie se localise au petit bassin. A la palpation, on sent une tumeur dure, mal limitée. Au toucher, les culs-de-sac paraissent encombrés; ils ont perdu leur souplesse et sont douloureux; l'utérus ne peut être mobilisé.