

masse dure et l'enfant arrive ainsi à la deuxième forme de péritonite tuberculeuse, la forme fibro-caséuse qui confirme la nature tuberculeuse de cette ascite, nature que peut encore prouver l'intervention chirurgicale qui permet de voir le semis de granulations sur le péritoine.

Comment déterminer la nature tuberculeuse d'une ascite? On écartera la néphrite puisqu'il n'y aura ni anasarque, ni albumine; on écartera les lésions du cœur puisqu'on ne verra pas d'asystolie; l'évolution de cette ascite empêchera de la rattacher à une cirrhose. Il y a un diagnostic différentiel très délicat à faire, c'est celui du kyste séreux du péritoine, et même celui d'une péritonite à pneumocoques à forme très lente.

Dans la forme fibro-caséuse, l'ascite disparaît et l'on a des gâteaux péritoneaux qui peuvent être considérables; la douleur est généralisée, les troubles digestifs sont accentués. Cette forme encore peut guérir, mais plus fréquemment, on assiste à l'infection lente de tout l'organisme ou à l'évolution vers un troisième type, la forme fibro-adhésive.

Cette forme guérit rarement; les complications sont fréquentes; tantôt une bride fibreuse donne de l'occlusion intestinale ou comprime l'intestin en masse, et l'intervention chirurgicale ne donne pas de grands résultats. Dans les autres formes, il peut se former des abcès cutanés suivis de fistules, parfois ulcératrices et perforation de l'intestin donnant une péritonite généralisée.

Au moment de l'ascite, le traitement à employer est le traitement général de la tuberculose. La compression a été essayée, notamment au moyen de bandes ou avec le collodion. Si le liquide augmente, on fait une ponction suivie d'injections ou de lavages, à l'eau boriquée ou même d'insufflation d'air stérilisé, à cause de l'influence curative qu'on attribue à l'air dans la guérison de la péritonite tuberculeuse par la laparotomie exploratrice.

Dans les deux autres formes, il n'y a guère à intervenir, à moins qu'il n'y ait des points d'ascite enkystée ou une bride comprimant l'intestin nettement délimitée: autrement, on ne pourrait lutter contre les néoplasies qui réunissent entre elles les anses intestinales.