

FACIAL NERVE.
Symptoms of Peripheral Facial Paralysis. Facial Diplegia.

(戊)最常之原、是惟傷寒、而系因以發炎於顳骨面系管之中、
(己)以癰致者、亦不無其人、其癰或與癰第二程之病狀同起。

(庚)患癰者、亦或有面癰之患。

雙面系癰、此少見之、其病原即顳腦底或腦橋或兩耳等有病、以疔症致者、
亦有之、胎生者亦有之。

面系幹癰狀

系支皆受累、面之一偏不動、且無志意感情之不同、其皮

亦不緇、臉不閉、下臉下墜、眼淚下、受患之一偏、其口角亦下墜、飲液之時、其
液易於溢出、其笑則面之兩偏顯然有別、其面肌動時、無癰之一偏縮、而受
患之一偏無力均之、遂成不正之形、言語稍稍受累、而亦不能作私私之聲、
蓋唇癰故耳、咀嚼之時、其食物皆積於受患之一偏、頰肌癰也、令之出舌、似
見其舌偏於受患之偏、實則其無患之一偏縮而口因以不止之故耳、視其
門牙、則舌非不中也、其激反應之功或失、腭簾或無恙。
其系於顳骨面系管內近鼓膜支本之處受傷者、其舌之前段之受患之偏
則失其嘗覺、如系之受傷之處為體骨以外者、其嘗覺初不受累、其耳常稍
稍聾、蓋有耳病先之也、其面或發癰、系痛者則少。