

faire dans le corps vitré, dans la conjonctive ; on peut aussi observer la kératite interstitielle, le choroïdite disséminée et l'amaurose intercurrente. A la ménopause survient l'iridochoroïdite. Dans les altérations de la situation de l'utérus, il y a des amliopies réflexes. On a décrit une kopioïpie hystérique au cours des exsudats inflammatoires pelviens. Durant la grossesse et l'accouchement, on rencontre l'asthénopie musculaire, la polyopie, le strabisme, la rétinite albuminurique, l'atrophie de la choroïde avec amaurose complète et décollement de la rétine, Durant la grossesse et l'accouchement, on trouve encore des otites moyennes. Les dermatoses sont souvent provoquées ou exagérées par la grossesse et l'accouchement. Pendant la menstruation, on observe l'érysipèle menstruel, l'herpès, l'eczéma, l'urticaire, le prurit vulvaire, des hémorrhagies cutanées dans la peau et de l'œdème de la vulve. Ce dernier s'observe aussi à l'époque de la ménopause. Pendant la grossesse il faut compter avec la pigmentation ; le chloasma de la ligne blanche et de l'aréole du mamelon ; avec l'herpès, l'eczéma, le prurit. Dans les cas d'affections cutanées rebelles et de cause inconnue chez la femme, Schauta a presque toujours rencontré une affection de l'appareil génital. L'influence de l'appareil génital sur les psychoses est extrêmement importante : 10 0/0 environ des maladies mentales observées chez la femme datent de l'état puerpéral ; aucune statistique n'indique combien de maladies résultent de l'appareil génital. Pendant la menstruation il y a souvent une exagération de troubles psychiques ; et l'on parle de psychose menstruelle quand une femme à sensorium intact, se trouve dans un état anormal au moment de la menstruation. Quand avant la conception il y a des troubles intellectuels ils sont en général modifiés dans un sens défavorables par la grossesse et l'accouchement ; dans quelques cas pourtant ils sont améliorés. Les femmes à neurasthénie héréditaire supportent mal les explorations gynécologiques répétées, les traitements locaux qui se prolongent ; il n'est pas rare qu'on ait dans ces conditions une aggravation des accidents nerveux, suivie d'une explosion de troubles mentaux ; les opérations comportant ablation de l'utérus et des ovaires sont particulièrement dangereuses.

(Revue Médico Chirurgicale des Maladies des Femmes)

Du plissement vaginal pendant l'accouchement.

Observation communiquée à la Société de médecine de Toulouse, par le docteur
LEGHEYRON.

Je désire appeler votre attention sur l'existence de replis vaginaux, de pseudo-cloisonnements du vagin pendant l'accouchement et en particulier sur leurs conséquences.