la tête et s'étend jusqu'aux jarrets et aux genoux, mais a tendance à ne pas descendre plus bas. La viande est de qualité ordinaire.

La prolificité est la qualité la plus caractéristique des Dorset. Les brebis peuvent faire deux agnelages, par an, l'un au printemps et l'autre à l'automne. Pour ne pas détériorer le troupeau, il est, cependant de bonne pratique de faire donner deux portées par an, qu'une année sur deux. Lorsqu'on dispose de bergeries chaudes et qu'on peut élever des agneaux de Noel ou de Pâques, qu'on vendra à l'âge de 10 ou 14 semaines, le Dorset est très profitable.

One ne peut recommander cette race dans la province, d'une façon générale, parce qu'elle ne se croise pas bien avec les races sans cornes et parce que la production de l'agneau de lait demande une habileté spéciale et exige des constructions coûteuses.

Suffolk.

Il y a très peu de moutons Suffolk dans la province. Ils sont plus petits que les Hampshire. La tête est nue et elle est d'un beau noir lustré, ainsi que les pattes.

BREBIS SUFFOLK.—Championne à l'exposition d'hiver d'Ottawa, en 1916.

BREBIS LEICESTER.—Championne à l'exposition d'hiver d'Ottawa, en 1916.

La viande est de qualité supérieure et elle se classe très près de celle du Southdown. La toison, quoique belle, n'est pas pesante et elle manque souvent de densité sous le ventre.

RACES A LAINE LONGUE

Cette classe comprend les races Leicester, Lincoln, Cotswold et Romney Marsh. Sauf la dernière, ces races sont répandues dans la province.