

30 cas de croup dont la moitié n'est pas opérée et est réchappée, moins 1 ; résultat qui n'a jamais été atteint, on peut l'affirmer sans crainte, par aucune méthode thérapeutique antérieure.

Sur les 15 cas qui furent opérés—ce qui représente presque 21.5 0/0 du nombre total des cas rapportés—nous avons 11 guérisons et 4 insuccès ; soit une mortalité de 21.7 0/0. La mort survient 2 jours 16 heures après l'opération chez l'enfant qui lui survit le plus longtemps (obs. L), et 15 heures chez celui qui succombe le plus tôt (obs. XLVI, bébé de moins de 10 mois.) Chez les opérés qui guérissent, le temps le plus court que la canule est en place, 1 jour 22 heures ; le temps le plus long, 6 jours 16 heures.

Voici, du reste, le tableau complet des opérations.

TEMPS QUE LA CANULE EST RESTÉE "IN SITU" CHEZ LES OPÉRÉS

No.	OPÉRATION.	OBS.	AGE.	TEMPS.	RÉSULTAT.
1.	Trachéotomie	I	2 ans 3 mois	3 jours 17 heures.	Guérison
2.	"	IV	5 " 3 "	3 " 22 "	"
3.	"	XV	2 " 4 "	1 " 19 "	Mort.
4.	"	XXV	2 " 8 "	4 "	Guérison.
5.	"	XXVII	4 " 3 "	3 " 18 "	"
6.	"	XXXVII	6 "	2 " 23 "	"
7.	"	XLIV	4 " 6 "	2 " 21 "	"
8.	"	XLV	6 "	1 " 22 "	"
9.	"	XLVI	10 "	15 "	Mort.
10.	"	L	6 "	2 " 16 "	"
11.	"	LI	2 " 3 "	1 " 16 "	"
12.	"	LIV	5 " 2 "	2 " 17 "	Guérison.
13.	"	LVIII	6 " 6 "	6 " 16 "	"
14.	"	LXX	5 " 9 "	3 " 17 "	"
15.	Tubage.	VII	3 " 4 "	6 " 14 "	"