

2. Créosote.	6 grammes.
Rhuin	250 —
Vin de Banyuls	850 —

Chaque cuillerée ne renfermant que 0 gr. 10 de créosote, ce mélange oblige à prendre une dose trop élevée d'alcool.

Les pilules et les capsules sont inférieures à ces solutions huileuses ou alcooliques. Il est, en effet, bien difficile de dépasser 0 gr. 05 par pilule, 0 gr. 10 par capsule. De plus, comme le remarque Marfan, très souvent les pilules traversent le tube digestif comme un corps étranger, sans être absorbées; la dose réellement utilisée reste donc assez incertaine.

Les symptômes d'intolérance en cas d'ingestion stomacale sont plutôt dus à l'irritation de la muqueuse de l'estomac qu'à l'absorption du médicament. Dans quelques cas pourtant, chez des sujets très sensibles à l'action de la créosote, des doses, même minimes peuvent entraîner des accidents d'intoxication. Burlureaux (1) a rapporté le fait d'un malade arrivé au dernier degré de la cachéxie, et qui, sur le conseil d'une personne incompétente, avait pris un cachet contenant 25 centigrammes de créosote. Avec cette dose faible, il y eut une véritable intoxication (refroidissement, vertiges, dyspnée intense); la mort survint dès le surlendemain, hâtez certainement de quelques jours par la créosote. On devra donc, en formulant les premières doses, toujours se défier de ces susceptibilités particulières.

* * *

La *voie rectale* assure pour la créosote une tolérance beaucoup plus grande que la voie stomacale; ce mode d'administration est plus simple que les injections hypodermiques.

On peut employer soit les solutions huileuses (méthode de Revillet), soit les solutions aqueuses de créosote (méthode de Chabaud).

Pour les solutions huileuses, Revillet fait dissoudre 2 à 4 grammes de créosote dans 30 grammes d'huile d'amandes douces; on émulsionne lentement avec un jaune d'œuf. On peut même, afin d'avoir une émulsion plus fine, ajouter une pincée de gomme adragante. Le mélange, une fois bien laiteux, est versé doucement dans 200 grammes d'eau légèrement tiède. Ce lavement est pris le soir et gardé toute la nuit, après avoir eu soin de vider auparavant le rectum par un lavement ordinaire. Un deuxième lavement peut être donné le matin.

Les solutions aqueuses ont l'inconvénient d'exiger une trop grande quantité de véhicule. Même à saturation, 4 grammes de créosote exigeraient près de 500 grammes d'eau. Mais, on peut réduire cette quantité de moitié, en ajoutant une cuillerée à bouche de cognac et en ayant la précaution de faire tiédir l'eau. Il importe, de plus, pour que la solubilité soit parfaite, d'employer

(1) R. SIMON. — "Créosote. Tolérance et intolérance." *Thèse*, Paris, 1899.