

trèfle, durant l'hiver ; mais, mangée ou non, la paille sèche conservera le trèfle, et ne sera pas perdue. Le trèfle doit être coupé avant que la fleur soit desséchée, et il doit être serré, s'il est possible, avec les fleurs et les feuilles, qui sont les parties les plus précieuses de la plante pour fourrage.

Il n'y a pas de meilleur foin que le mil coupé à temps et bien conditionné ; nous ne croyons pas même qu'il y en ait d'aussi bon. Le trèfle est aussi très estimé, mais sa valeur dépend du temps où il a été coupé, et de la manière dont il a été soigné. Les autres variétés de foin, produites sur les prairies naturelles demandent à être traitées autrement que le mil et le trèfle ; il n'est pas nécessaire de les couper d'aussi bonne heure dans la saison, mais il leur faut plus de soins pour les faire sécher, avant de les serrer. On doit les saupoudrer de sel, en les serrant. Il ne faut pourtant pas tarder trop à couper le foin naturel ; la saison devient moins favorable, et le foin n'est pas d'aussi bonne qualité, lorsqu'il a été fait trop tard. Un temps sec et clair pour la fenaison tourne à l'avantage du cultivateur, de l'acheteur et du bétail. Nul produit ne souffre autant que le foin d'un temps humide. Il y a une autre partie de la fenaison que nous voyons négligée en Canada, c'est le ratelage. Quand le foin n'est pas d'abord ramassé soigneusement, il en reste à rateler une partie considérable, et si le ratelage ne se fait pas avant que le foin ait été trop longtemps exposé aux influences du tems, il ne vaut plus guère la peine d'être recueilli. Rien ne marque tant de négligence ou d'insouciance, qu'un foin mal ramassé, et qui n'a pas été ratelé à temps. Toute récolte produite doit être recueillie, et le fermier qui craint de n'être pas payé de sa peine, ou qui se hâte trop pour pouvoir faire l'ouvrage convenablement, devrait cultiver moins, pour le faire plus soigneusement et plus convenablement. Selon notre manière de voir, celui-là se rend coupable devant Dieu, qui laisse perdre une partie de ses récoltes, pour ne les pas recueillir soigneusement.

Nous avons vu des champs de patates ensemencés dans le mois de Juin, labourés et ensemencés de nouveau, par la raison que la première semence avait pourri dans la terre. Dans un cas particulier, le sol ne paraissait pas trop humide, lorsqu'il fut d'abord ensemencé, ayant été labouré, hersé et fumé immédiatement avant la semaille. Nous ignorons si le mal s'est étendu considérablement, mais nous croyons qu'il est peu sûr de planter des patates coupées quand le temps est très chaud, comme il l'a été dans le mois de Juin. Si elles n'étaient pas coupées, elles ne seraient pas aussi sujettes à pourrir. Il vaut beaucoup mieux semer les patates de bonne heure que tard, et cette année, là où elles ont été semées de bonne heure, dans une terre sèche, nous ne leur avons jamais vu une plus belle apparence. Nous craignons aussi que les grains semés tard ne réussissent pas bien, à moins qu'il ne pleuve de temps à autre. Il n'est pas possible que les jeunes plantes croissent rapidement dans un sol sec, sans de fréquentes ondées. Dans le fait, nous avons vu des prairies à sol sec beaucoup affectées par la chaleur vers le 22 de Juin, et l'herbe y paraît comme brûlée. Nous n'avons jamais vu le sol, s'il avait été labouré ce printemps, devenir plus dur et plus motteux que dans le mois de Juin. Nous craignons que la graine de foin semée en Juin ne réussisse pas bien, si le sol n'a pas été préalablement bien rompu et ameubli. La graine de foin semée de bonne heure a bien réussi, et dans notre climat, il est rare qu'elle réussisse, si elle est semée après la mi-mai. La grande chaleur et la sécheresse sont défavorables à la crue de la graine de foin. Les pâturages ont continué à être très bons jusqu'à cette heure ; mais une chaleur et une sécheresse continues leur deviendront préjudiciables, là où ils sont exposés et ne sont pas couverts d'une herbe épaisse. Le grand avantage des pâturages bien fournis d'herbe est que la chaleur et la sécheresse ne les affectent pas aussi promptement que ceux