

Couvertures inférieures de la queue, gris sombre terne ou noir avec des lignes en flèche proéminentes et une bordure terminale. Le blanc augmente vers la base de la queue et finit par envahir la couleur dominante des plumes.

Tête d'un gris très sombre au gris sombre, plus noir sur la couronne et les couvertures des oreilles, de faibles taches de couleur rouille apparaissant surtout sur l'avant à la base du bec et obscurcissant plus ou moins la couleur dominante des plumes les plus sombres et enfin se terminant sur le dos et les côtés de l'avant-gorge en une faible teinte olivâtre.

Gorge, blanche avec de petites taches d'un gris très foncé, mais irrégulières, s'agrégeant sur la région de la joue, chaque plume tachetée se terminant par une bordure blanche peu large.

Lores, gris sombre terne tacheté de blanc.

Les plumes de couleur foncée de l'estomac, bordées de blanc jaunâtre, le blanc graduellement empiétant sur les points noirs vers les côtés, finalement recouvrant presque toute la plume de telle sorte qu'une ligne à demi cachée apparaît le long des côtés du cou jusqu'à la courbure de l'aile au repos.

Les caractères particuliers de la femelle sont moins prononcés que ceux du mâle et sans l'aide d'une série pour comparaison, il serait difficile de les reconnaître. Toutefois, ils sont à peu près semblables à ceux du mâle, étant en dessous d'un bleu plus net que *richardsoni* et plus sombre en-dessus, avec les taches de couleur rouille plus prononcées et plus caractéristiques.

Mesures (en pouces). Mâles, moyenne obtenue de quatre spécimens:

Aile, 8.25-8.75 (moyenne de 8.51); queue, 6.5-6.75 (moyenne de 6.33); tarse, 1.70-1.80 (moyenne 1.75); mandibule supérieure, 0.65-0.75 (moyenne 0.71).

Femelles, moyenne obtenue de douze spécimens:

Aile, 7.45-8.10 (moyenne de 7.70); queue, 5.10-5.75 (moyenne de 5.25); tarse, 1.48-1.68 (moyenne de 1.55); mandibule supérieure, 0.65-0.71 (moyenne 0.69).

Distribution géographique. La description ci-dessus est basée entièrement sur des spécimens pris dans un rayon de vingt mille du lac Teslin, sur la frontière entre la Colombie britannique et le Territoire du Yukon, longitude 130° 30', à la base ouest des monts Cassiar. La limite de distribution de cette forme ne peut donc être définie, quoique l'étude des échantillons examinés parle par elle-même.

Les spécimens mâles dans cette série sont comme suit: Colombie britannique: Trail; Midway et Revelstoke: 7 spécimens.

Montana et Idaho: les monts Preuss, le creek Fiddle, et les montagnes de Nyak et Beartooth: 4 spécimens.

Mackenzie: fleuve Mackenzie: 1 spécimen.

Territoire du Yukon: le lac Teslin: 4 spécimens.

	Aile	Queue	Tarse	Mandibule supérieure	Couleur générale
Montana et Idaho	9.06	6.56	1.80	0.80	Claire
Colombie britannique	8.90	6.96	1.77	0.77	Un peu plus foncée
Mackenzie	8.75	6.55	1.70	0.80	Claire
Lac Teslin, T. Y.	8.51	6.33	1.75	0.71	Sombre

L'on peut donc constater que les oiseaux venant du plus loin dans le sud sont les plus gros et de couleur moins foncée; ceux venant du plus loin dans le nord sont les plus petits et de couleur moins sombre, tandis que les oiseaux du sud de la Colombie britannique tiennent le milieu,