

- Erica africana, rusci folio. Seb. thes. 2. p. 15. t. 12. f. 9*
Habitat in Æthiopia, Hispania. h
- uncyura.* 4. PASSERINA foliis linearibus oppositis, floribus terminalibus solitariis, ramis glabris.
 Thymelæa foliis triquetris cruciatim oppositis, flore feticeo. *Burm. afr. 132. t. 48. f. 2.*
 Thymelæa ramosa, linearibus foliis angustis, flore solitario. *Burm. afr. 131. t. 48. f. 1.*
Habitat in Æthiopia. h

LACHNÆA.

- crioccephala.* 1. LACHNÆA capitulis solitariis lanatis, foliis quadrifariam imbricatis.
Habitat in Æthiopia. h
 Folia *trigona, gibba. Capitula terminalia, solitaria, tomentosa, cincta lana candida.*
- conglomerata.* LACHNÆA capitulis confertis, foliis laxis.
 Thymelæa africana, polii angustioribus foliis, floribus in capitulis summo caule glomeratis. *Pluk. mant. 179. Raj. dendr. 54.*
 Sanamunda 3. clusii affinis, polii folio. *Breyn. cent. 18. t. 7.*
Habitat ad Cap. b. Spei. h

Pag. 35. inter Melobryam & Læsingiam.

ORTEGA.

- hispanica.* 1. ORTEGA. *Læst. epist. VIII: 43.*
 Rubia linifolia aspera. *Bauh. pin. 333.*
 Juncaria salmatica. *Clus. hist. 1. p. 174.*
Habitat in Castilia Minor. Bætica Velez, Salmantica. O

Pag. 79.

- membranacea* 4. STIPA pedicellis dilatis membranaceis.
sed *Habitat in Hispania. Læsing.*
 Gr. *vix pedale, habitu Aven.c. Panicula simplex, vix subdivisa, laxa, debilis. Pedicelli membranacei, ancipites, obtusiusculi. Calycis arista longitudine ariste corollinae.*

Pag. 84.

- Hyssix.* 6. ELYMUS spiculis involucre destitutis.
 Gramen avenaceum, locustis aristatis, paniculis echinum referentibus. *Gronov.*
Habitat in - - -
 Spica composita ex spiculis duabus ad fungulum dentem.
 Spicula quadriflora; aristas longis. Involucre nulla sed hunc loco Calli duo.

