Remèdes.—Les œufs étant protégés par la peau du fruit, on ne peut atteindre les larves. Au début de la saison, il faut détruire les insectes parfaits, si l'on veut éviter les dégâts. Les pulvérisations empoisonnées peuvent avoir du succès. La deuxième pulvérisation pour le pommier, indiquée dans le calendrier, doit contenir quatre livres d'arséniate de plomb par tonne, si les charançons promettent d'être nombreux. Mieux vaut, quand il y a une forte attaque, donner avec soin le quatrième arrosage avec trois livres d'arséniate de plomb par tonne. **L'entière destruction de tous les fruits tombés, (le plus tôt possible, avant que les larves ne quittent la pomme),** est très propre à empêcher les insectes de nuire l'année suivante.

Cet insecte se reproduit aussi dans les prunes, qu'il choisit de préférence aux pommes. C'est pourquoi, dans un verger de pommier, il est bon d'avoir quelques pruniers servant d'arbres-pièges pour les charançons. Evidemment, il faut détruire avec soin et promptement les prunes véreuses. Le prunier doit être constamment couvert d'arséniate de plomb pendant la formation du fruit, afin de tuer, autant que possible, les insectes adultes. Mettre trois livres d'arséniate de plomb par tonne (voir le calendrier).

Le secouement des pruniers et des petits pommiers, en temps opportun, diminue beaucoup le dommage. Inquiétés, les charançons se laissent tomber à terre. Étendre une grande toile blanche au-dessous de l'arbre et frapper le tronc et les grosses branches avec un maillet rembourré. Jeter les charançons dans un vaisseau contenant du pétrole. Il est préférable de secouer les arbres de bon matin, alors que les insectes sont encore engourdis.

La Mouche à pomme (Ver chemin de fer), *Rhagoletis pomonella*.—Cet insecte n'est pas encore très répandu ; il n'en est pas moins dangereux partout où on le trouve. Il est nécessaire de faire le possible pour le combattre aussitôt qu'il est signalé. L'insecte parfait est un petit diptère, avec des barres noires sur le travers des ailes. Il dépose ses œufs sous la peau du fruit. Ses larves creusent dans toute la pulpe de très petites galeries sinueuses. Les petits vers pointus,