

septique pulmonaire. — *Ind.* : Tuberculose. — *Pos.* : 0 gr. 10 à 0 gr. 30. — Solution huileuse. — Inj. sous-cut.

*Bleu de méthylène*. — (*Chlorure de tétraméthyllithionine*). — S. eau. — *P. T.* : Antiseptique, antinévralgique ; est éliminé par les urines, partie sous forme de bleu, partie sous forme d'un produit de réduction incolore, réoxydable par ébullition avec acide acétique. — *Ind.* : Étude de la perméabilité rénale. *Post.* : 1 à 4 cc. de la solution à 10%. — Inj. sous-cut.

*Bromipine Merck* (non déposé). — Huile de sésame ayant absorbé 10% de son poids de brôme. — *P. T.* : Succédané de K Br. — *Pos.* : 1 à 3 cc. — Inject. sous-cut. — *Assez douloureux*.

## C

*Cacodylate de soude*. — (*Diméthylarséniate de soude*) : 46,87% d'arsenic dissimulé 0 gr. 10 = 0 gr. 615 ac. arsénieux ou 0 gr. 15 liq. de Fowler ou 0 gr. 19 d'arséniate de soude. — S. eau. — *P. T.* : Reconstituant, accélère la nutrition et les échanges nutritifs. Tonique nervin. — *Ind.* : Tuberculose 1<sup>e</sup> et 2<sup>e</sup> périodes, anémies, dermatoses, neurasthénies, syphilis (?). — *Pos.* : Jusqu'à 0 gr. 40 par jour chez l'adulte, 0 gr. 05 à 0 gr. 04 chez l'enfant. — *Peu toxique*. — Inj. sous-cut. — *Assoc.* : Avec sulf. de strychnine, comme névrosthénique

*Cacodylate de chaux*. — Mêmes indic. et posol. que cacodyl. de soude.

*Cocadylate de fer* (V. Fer).

*Cacodylate de gaiacol*. — S. eau et huile. — *P. T.* et *Ind.* — Antiseptique, préconisé dans la tuberculose, peu actif. — *Pos.* : Jusqu'à 0 gr. 10 par 24 h. — Inj. intra-musc.

*Cadocylate de magnésie*. — Mêmes indic. et posol. que cacod. de soude.

*Cacodylate de mercure* (Iodo-cacodylate). — (V. Mercure).

*Cacodylate de strychnine*. — *P. T.* et *Ind.* : Celles de la strychnine. — S. eau. — *Pos.* : 1 à 2 milligr. — Inj. sous-cut. — *Non douloureux*.

*Caféine*. — Peu s. eau ; très s. en présence de benzoate, salicylate ou cinnamate de soude. — *P. T.* : Tonique du cœur, exci-