

Travaux Originaux

DE L'INTERVENTION CHIRURGICALE DANS LE TRAITEMENT DES PLEURESIES PURU LENTES TUBERCULEUSES

(*Suite*)

Après cet exposé sommaire sur la pathogénie et l'évolution de la pleurésie purulente tuberculeuse, j'aborderai immédiatement la question du traitement, en me limitant, surtout aux indications de l'intervention chirurgicale, qui devient le principal problème à discuter, pour le médecin praticien, une fois que l'empyème est nettement réalisé.

Mais il ne sera pas sans intérêt de se demander, tout d'abord, si les épanchements purulents d'origine tuberculeuse de la plèvre peuvent guérir?

Tous les opérateurs sont unanimes à affirmer que la pleurésie purulente tuberculeuse ne saurait guérir sans une intervention chirurgicale. Les résultats que l'on peut espérer des différents procédés de l'intervention chirurgicale radicale, dans cette variété de pleurésie, sont loin cependant d'être aussi favorables que pour les autres pleurésies purulentes. L'ensemble des statistiques démontrent, en effet, que la guérison est, ici, plutôt ex-

(1) Travail présenté au deuxième Congrès des médecins de langue française de l'Amérique du Nord, tenu à Montréal, le 28, 29, 30 juin 1904.