

doses fractionnées de poudre d'opium ou de Dower. Mais cette médication doit être suspendue quand l'épanchement constitué provoque mécaniquement la douleur.

Les affections valvulaires du cœur peuvent déterminer des accidents réclamant d'urgence l'emploi d'opiacés. Tel est le cas de l'embolie pulmonaire. L'injection de morphine au niveau du point de côté fait cesser la dyspnée. La poudre de Dower, spécifique des hémoptysies, est également nécessaire. Les mêmes indications peuvent être formulées pour les congestions pulmonaires au cours du rétrécissement mitral et pour les accidents granido cardiaques.

Enfin à la dernière phase de l'asystolie, de la cachexie cardiaque, l'ultime remède est la morphine. (*Journal de médecine et de chirurgie*, Art. 25948).

— :000 : —

BIBLIOGRAPHIE

LEÇONS DE CHIMIE MÉDICALE

Par A. VALLÉE

Il nous fait plaisir de présenter aux lecteurs du Bulletin, les leçons de chimie médicale publiées par M. le Dr A. Vallée,

Professeur de chimie médicale depuis plusieurs années, le Dr Vallée a eu l'heureuse idée de réunir en un volume ses leçons aux élèves de la faculté de médecine; et il nous présente un ouvrage