

Mais on la donne plus souvent mêlée au sirop d'ipéca dans la proportion suivante :

Poudre d'ipéca..... 0 gr. 20—0 gr. 30—0 gr. 50—1 gramme.
Sirop..... 30 grammes.

Dans les deux premières années le sirop est suffisant.

Au-dessus de deux ans la poudre d'ipéca pure pourra être administrée dans de l'eau ou dans un sirop quelconque.

L'administration des remèdes ne constitue pas toujours une opération facile ; deux moyens sont à notre disposition, la violence, ou un remède masqué dans un véhicule flattant le goût.

Le moyen violent le plus simple consiste à envelopper l'enfant dans une couverture ; vous le tenez entre vos jambes et vous lui introduisez doucement entre les dents la cuiller à café chargée du médicament, puis vous inclinez l'enfant, le liquide tombe naturellement, et l'opération est finie, un mouvement réflexe de déglutition empêchant l'enfant de rejeter le médicament.

Le sirop de violette, de fleurs d'oranger, le looch blanc du codex No. 1, etc., constituent des véhicules agréables au goût et à l'odorat. Le yerba santa tue complètement l'amertume de la quinine.

2^e *Tartre stibié*.—Dans les cas seuls où l'ipéca sera impuissant à provoquer le vomissement, on aura recours à l'émétique.

Pour les enfants de moins de deux ans, on prescrira la formule suivante :

Emétique..... $\frac{1}{2}$ grain ou 0 gr. 0.25.
Eau de tilleul..... 100 gr.

A prendre tiède, en 4 ou 5 fois, de dix minutes en dix minutes.

A partir de deux ans, on peut porter la dose à un grain.

On ne doit pas oublier que l'ipéca et l'émétique n'ont pas seulement une action vomitive, mais qu'ils sont des excitants de la muqueuse digestive, pouvant provoquer un flux diarrhéique considérable, le tartre stibié particulièrement.

Indications et contre-indications.—C'est surtout dans les maladies des voies respiratoires et digestives que les vomitifs sont d'un fréquent usage. Nous allons passer en revue les principales, donnant la mesure d'intervention des vomitifs et traçant le rôle qui leur appartient.

Affections des voies respiratoires—1^{re} *Laryngites*.—Elles peuvent être : A, de nature inflammatoire (légères ou intenses) ;—B, spasmodiques (laryngite striduleuse, faux croup) ;—C, diphthéritiques (croup) ; les laryngites chroniques ne se rencontrent généralement pas chez les enfants.