celles qui épuisent si cruellement les phthisiques. Il la donne le soir en pilules de 3 milligrammes. Dans plus de la moitié des cas la transpiration avait cédé après trois ou quatre pilules, d'autres fois l'effet seulement n'était sensible qu'après huit ou dix jours ; dans un tiers des cas, l'effet fut nul et le médicament dut être abandonné. L'effet a été le plus souvent durable et les transpirations ne reparaisaient pas lorsqu'on cessait l'emploi de la belladone ; quelquefois il fallait y revenir au bout de quelques jours. La plupart des malades réclamaient eux-mêmes leur pilule, disant en obtenir un grand soulagement.—(*Brit. Med. Journal.*) *Bulletin Gen. de Thér. Med. et Chir.*

DE L'EMPLOI DU SILICATE DE POTASSE DANS LE TRAITEMENT DE L'ÉRYSIPELE.—Dans un long mémoire présenté à l'Académie des sciences de Lisbonne, M. Alvarenga a rassemblé quarante-huit observations cliniques et un grand nombre d'expériences qui mettent hors de doute l'action thérapeutique du verre soluble. C'est presque exclusivement à l'extérieur qu'il en a fait usage dans les cas d'érysipèle. La solution contient une partie de silicate de potasse pour 1 à 10 parties d'eau. Le silicate contient 1 partie d'acide silicique pour 4 parties de solution potassique. La guérison semble avoir été d'autant plus rapide que la solution était plus concentrée.

L'auteur a répété ses expériences au Brésil ; il a eu sept occasions d'y traiter des érysipèles avec une solution au tiers ou au quart ; la guérison ne se faisait pas attendre plus de trois jours.—(*Neues Repertorium für Pharmacie.*) *Bul. Gén. de Thér. Med. et Chir.*

ENGELURES.—Comme la saison des frimats approche, il est utile de mentionner que le Dr. Köpes, chirurgien de l'expédition Autrichienne au Pôle Nord, a obtenu d'excellents effets de la mixture suivante :

R Iode.....	4 parties
Ether.....	30 "
Collodion... ..	100 "

Au poids.

DU DÉLIRE ET DU COMA DIGITALIQUES.—M. Durozier résume d'abord seize observations où la digitaline paraît avoir été la cause d'accidents comateux ou délirants, puis il ajoute :

“ D'après ces faits, si notre interprétation est juste, ce que nous affirmons pas, des doses modérées ont pu donner la mort. Sans doute et heureusement, les accidents ne se montrent pas toujours, mais il suffit qu'ils soient possibles pour qu'on surveille le médicament pas à pas comme le conseille Hirtz.