

L'oreille gauche a continué à s'améliorer progressivement, tandis que l'oreille droite a semblé subir une diminution passagère.

OBSERVATION VIII (Raoult)

Mlle Sch. (V.), âgée de 28 ans, a commencé à percevoir des bourdonnements et à devenir sourde vers 1902 ou 1903 du côté gauche. L'oreille droite a commencé à être atteinte vers 1907. Je l'ai soignée en 1908 pour du catarrhe subaigu des deux caisses; elle avait à cette époque du catarrhe nasal chronique et un petit reste de végétations adénoïdes, dont je pratiquai l'ablation. Il se produisit une amélioration assez notable. Mais au début de 1910 à la suite de contrariétés et de fatigues la surdité augmenta de nouveau.

1^{er} examen le 14 mars 1911 :

	O. D.	O. G.
Montre	0 m. 02	0 m. 07
Voix haute	2 m. 80	1 m. 20
Voix chuchotée	0 m. 50	0 m. 40

Le Rinne est négatif des deux côtés.

La rééducation auditive est commencée le 28 mars.

2^e examen le 4 avril 1911 :

	O. D.	O. G.
Montre	0 m. 06	0 m. 12
Voix haute	4 m. 75	4 m. 50
Voix chuchotée	0 m. 85	0 m. 70

3^e examen le 5 mai 1911 après 50 séances de rééducation :

Montre	0 m. 04	0 m. 02
Voix haute	7 m. 90	9 m. 55
Voix chuchotée	4 m. 20	6 m. 00

4^e examen le 22 juin 1911 après six semaines de repos :

Voix haute	8 m. 80	11 m. 90
Voix chuchotée	7 m. 50	9 m. 90
Montre	0 m. 04	0 m. 06

Au mois de novembre à la suite d'un coryza, Mlle S. a eu du catarrhe des caisses. Malgré cette indisposition, on constate le 11 décembre 1911 :

	O. D.	O. D.
Voix haute	12 m. 00	12 m. 00

OBSERVATION IX. (Zünd-Burguet)

Nous reproduisons ici l'auto-observation (1) du D^r Thouvenin.

(1) Publié en 1911 dans le journal l'*Ouïe*, par le D^r LEGRAND.