

obtiendra à l'automne une floraison magnifique.

Bordures.—Replanter aussitôt que la terre le permet; étendre les branches en éventail, tailler également les plus hautes et couper les racines très près, puis planter en ligne dans du sable pour hâter la pousse des racines, et enfin presser la terre autour des plantes à l'aide d'un maillet.

Les gazons peuvent être repiqués ou préparés plus facilement à cette époque que plus tard; la seule précaution à prendre est de bien ameubler le sol sur lequel ils reposent et les serrer bien près les uns des autres, afin d'éviter toute fissure entre eux.

Il est plus facile de se procurer des engrais à cette saison qu'en tout autre temps. Une couche de fumier, des cendres pures ou lessivées, du guano, donneront d'excellents résultats, et c'est la meilleure époque pour appliquer des engrais de toutes sortes aux arbustes et aux arbres d'ornement.

Une couche chaude est indispensable aux grands parterres pour partir les boutures et pour les semis des graines. Les boutures vertes de même que celles des plantes à bois tendre, exigent beaucoup de chaleur autour des racines et en même temps de la fraîcheur autour des branches jusqu'à ce que le chevelu des racines soit bien développé. Eviter trop d'humidité, et augmenter la ventilation jusqu'à ce que les plantes puissent supporter la transplantation en pleine terre.

SERRES.—Elles doivent être très-belles à cette époque bien que quelques-unes des plus belles fleurs aient maintenant passé floraison. Chaque chose doit être à sa place sans qu'on puisse voir une feuille morte, une branche coupée, ou de la poussière sur les fleurs. Ventiler lorsque la journée est belle sans permettre de courants d'air tombant directement sur les plantes. Il faut régler la chaleur selon le but qu'on se propose. Si la serre n'est destinée qu'à protéger les plantes contre les gelées jusqu'à ce qu'elles fleurissent en pleine terre, une température de 40° à 45° est bien suffisante. Si on désire des fleurs immédiatement, ou une croissance rapide, de manière à ce qu'elles soient prêtes à transplanter aux premiers beaux jours, il faut donner une température d'été de 65° à 75°, et pour la culture des plantes tropicales la température doit s'élever jusqu'à 90° au soleil et baisser naturellement pendant la nuit. Les accacias, heaths, azaleas et epocris doivent être placés à l'ombre des rayons du soleil.

Fleurs annuelles.—Semer dans des pots pour être transplantées en juin en pleine terre.

Cactus.—Arroser ceux qui sont en fleur.

Camélias.—Visiter ceux qui ont passé fleur pour les débarrasser des araignées rouges; laver le feuillage, seringuer et tailler.

Giroflées.—Faire des boutures, arracher les vieux plants et ne les garder jamais au-delà d'une année.

Les Fuchsias, chrysanthèmes peuvent être multipliés à cette époque par boutures prises sur le nouveau bois. Replanter et tailler les vieux plants.

Les geraniums, pelargonium, primeroses de Chine, cinerarias en fleurs ou au moment de fleurir doivent être placés près des chassis et fréquemment tournés.

Insectes.—Détruire par des arrosages fréquents et la fumée de tabac.

Penstées.—Dans les couches froides elles doivent être retardées par une bonne ventilation, l'obscurité et une température peu élevée.

Fleurs de salon.—Elles exigent encore plus de soin que les plantes de serres chaudes: Recouvrir la terre des pots de mousse pour retenir l'humidité, les tourner souvent, surtout si elles sont près d'un chassis, afin qu'elles poussent droites; arroser assez pour que les plantes fassent bien mais rien de plus. La surface de la terre peut paraître sèche tandis qu'il y a assez d'eau près des racines; il doit toujours y avoir de l'eau en évaporation dans la chambre pour assurer l'humidité nécessaire.

Rosiers.—Les boutures reprises et les rosiers, destinés à fleurir bientôt en pleine terre, doivent être mis dans de nouveaux pots. Il faut arroser en proportion de la croissance des plantes, et comme la végétation dans les serres est très active maintenant, il faut seringuer les fleurs et les murs de manière à entretenir une atmosphère toujours humide par l'évaporation. L'eau aura encore pour effet d'arrêter la multiplication des insectes elle devrait avoir la température de la serre.

ORANGERIE.—Blanchir à la chaux avec un peu de fleur de soufre; lever les vignes aux premiers jours chauds, ventiler, et arroser avec du fumier; n'attacher aux échelles que lorsque tous les bourgeons sont également avancés, et entretenir beaucoup d'humidité au moment où ils s'ouvrent. Là où les vignes sont plus avancées, beaucoup de ventilation, surtout pendant la floraison, seringuer souvent et enlever les bran-