

Avant l'âge de 10 ans, 70 p. c. des tumeurs disparaissent complètement.

Entre 10 et 45, elles diminuent d'une manière très sensible.

Après 45 ans, la diminution ne dépasse pas $\frac{1}{2}$ à $\frac{1}{3}$ du volume.

Cette règle souffre pourtant des exceptions.

“ L'opération, dit-il, ne soulage pas seulement, elle guérit entièrement et d'une manière permanente.” (1)

Les électriciens peuvent-ils en dire autant de leur méthode ? Sans doute la castration a des échecs, mais ce n'est pas là une preuve de l'efficacité de l'électricité. Car il est loin d'être vrai que le galvanisme doive réussir là où la castration n'a pas réussi. Nous avons lu plus souvent l'histoire de cas où l'électricité ayant échoué, on pratiqua la castration qui, de suite, apporta une amélioration marquée à l'état de la malade.

Dans les observations qui précèdent et celles qui suivent, l'on verra des pièces justificatives suffisantes, dont nous aurions pu augmenter le nombre si nous l'avions eu nécessaire—de la manière que nous avons envisagé la question du courant galvanique.

Obs. I. (Inédite) — Mme Dupré, 38 rue Duret, 46 ans. Elle fut traitée longtemps par le Dr Tripier. Fibrome du ligament large droit, accolé à la moitié droite de l'utérus, gros comme le poing environ. Utérus refoulé et rejeté à gauche. Hystérométrie : 9-10 cent. Electrolyse datant de plusieurs mois ; amélioration de l'état général ; constipation toujours opiniâtre ; pertes de sang aussi considérables qu'avant ; douleurs aussi vives dans les lombes et les aînes. En somme, succès local nul. La malade n'est venue à la consultation du Dr Doléris qu'une fois.

Obs. II. — Le Dr Kellogg, dans son mémoire, publie un cas (Obs. V) où il a appliqué un courant de 300 mill. avec des résultats moins que bons. Les hémorrhagies ne furent pas diminuées et la tumeur continua de croître. L'état général s'aggravant, on fit la castration et tout rentra bientôt dans l'ordre, le fibrome diminuant rapidement et les symptômes ne se renouvelant plus.

Obs. III. — Tout l'intérêt de l'observation du Dr Pryor, que nous avons donnée plus haut, réside dans la longue et très soigneuse application du traitement électrique (3 ans) avec des résultats fort mauvais et fort douloureux. Il en est de même du cas du Dr Coe.

(1) *Loc. cit.*