

la grossesse, au moment où la question de l'accouchement prématuré se posera, sera arrivée à une époque où la viabilité de l'enfant est assurée. En attendant le terme, on court le risque de voir l'albuminurie accomplir son œuvre néfaste et tuer le fœtus *in utero*.

L'observation qui précède montre combien ces craintes sont fondées et en ce qui concerne l'enfant et en ce qui concerne la mère. Elle vient aussi à l'appui de l'opinion de ceux qui pensent que dans certaines circonstances il est parfaitement légitime d'interrompre le cours de la grossesse. Que serait-il advenu de ce rein déjà si profondément altéré, si la grossesse avait encore parcouru le long mois qui restait avant d'avoir atteint le terme normal? Si les événements ne s'étaient pas aussi rapidement précipités, si la mort de l'enfant n'était pas survenue aussi vite, n'aurait-il pas mieux valu, l'insuccès de la thérapeutique étant démontré, avancer le moment de l'accouchement, plutôt qu'attendre patiemment en exposant la vie du fœtus aux dangers qui la menaçaient?

Instruit par ce fait, M. Puech, en terminant, se déclare partisan de l'accouchement prématuré dans certains cas d'albuminurie gravidique, les cas où, ainsi que le dit M. Pinard, une albuminurie grave existant, le régime lacté absolu continué pendant huit jours au moins n'a donné aucun résultat, — l'albuminurie ne diminuant pas ou même continuant à faire des progrès. — *Nouv. Montpel. médic.*

Un procédé de mensuration externe permettant de reconnaître la viciation du bassin chez la femme.—M. le docteur P. REYNAUD (de Marseille) a pu se convaincre de l'existence, chez les femmes à bassin normal, d'une relation constante et mathématique entre la distance qui sépare les deux épines iliaques antérieures et supérieures et celle qui sépare une de ces épines de la pointe inférieure de la rotule (pointe anatomique) correspondante.

Ainsi la distance interépineuse, mesurée au compas d'épaisseur, serait exactement égale à la moitié de la ligne allant d'une épine iliaque antérieure et supérieure à la pointe inférieure de la rotule du même côté, ligne qu'on mesure à l'aide d'un simple ruban métrique.

Chez les femmes à bassin vicié il y aurait toujours, d'après les observations de notre confrère, disproportion entre ces deux mesures. Plus cette disproportion est grande, plus le bassin est anormal.

Dans certains bassins rachitiques, la ligne interépineuse atteindrait souvent les deux tiers de la distance qui existe entre l'épine iliaque et l'extrémité de la rotule; parfois même elle égale cette distance.

La mensuration du diamètre promonto-sous-pubien confirmerait