

Hyperhémie conjonctivale, douleur, larmolement et photophobie. Donc k ratite en bandelette.

*Traitement*: Pendant 15 jours le traitement m dical, local et g n ral, est instit . Aucune am lioration.

Le 5 avril, abrasion conjonctivale partielle et raclage de la bandelette vasculaire, sous chloroforme. Pansement occlusif avec pommade d'Iodoforme.

Le 8 avril, am lioration perceptible.

Le 11 avril, l'am lioration continue. Suppression du bandeau.

Le 24 avril: gu rison avec petit leuc me transparent.

OBSERVATION IV. — M. R.,  g e de 10 ans. M re morte de tuberculose, p re en bonne sant . Rien de particulier dans les ant c dents de l'enfant. Entre   l'H tel-Dieu le 15 f vrier 1901 souffrant de k ratite en bandelette des deux yeux. Le traitement m dical ordinaire est prescrit: compresses chaudes d'une solution d'acide borique, atropine, toniques   l'int rieur. Le 13 mai l'enfant retourne chez elle am lior e mais non gu rie.

Le 14 avril 1902, M. R., revient   l'h pital atteinte tout comme l'ann e pr c dente de k ratite en bandelette des deux yeux.

Le 18 avril l' il gauche est op r  et le 25 cet  il est assez am lior  pour permettre d'enlever le bandeau.

L' il droit est   son tour soumis au traitement chirurgical.

Le 5 mai l'enfant laisse l'h pital parfaitement gu rie.

Sur le m me sujet, le traitement chirurgical donnait en quinze jours le r sultat qu'un traitement m dical continue pendant trois mois l'ann e pr c dente avait en vain laiss  esp rer.