

ou bien:

2°

Thymol	100 grammes
Camphre	200 —
Ether sulfurique	300 —
2 à 5 c. c. (40 à 100 gouttes).	

Noix vomique (Poudre. — Extrait) (1)

Quand on recherche un effet tonique, stimulant, eupéptique, on s'adresse de préférence à la poudre de noix vomique, que l'on donne seule ou associée à d'autres poudres. M. Comby prescrit, dans la dilatation de l'estomac, l'atonie gastrique à un enfant de 3 à 5 ans, les paquets suivants:

Poudre de noix vomique	1 centigr.
Bicarbonate de soude	0 gr. 20
Magnésie calcinée	0 — 20
Pepsine	0. — 10

en 1 paquet n° 20. En prendre un matin et soir au commencement du repas, dans une cuillerée de potage ou de confiture.

Après dix jours d'interruption, on recommence la médication. Le bicarbonate de soude facilite la tolérance de la noix vomique et influence favorablement la digestion. Si l'enfant a plutôt une tendance à la diarrhée, on prescrit les paquets suivants:

Poudre de noix vomique	1 centigr.
Bicarbonate de soude	0 gr. 20
Salicylate de bismuth	0 — 20

en 1 paquet n° 20.

Chez l'adulte on combattra l'atonie gastrique avec les cachets ainsi formulés:

Poudre de noix vomique	5 centigr.
Bicarbonate de soude	0 gr. 20
Phosphate de soude	0 — 30

en 1 cachet n° 20; en prendre un, une demi-heure avant les deux principaux repas, avec un demi-verre d'eau; ou bien avec ceux-ci:

Poudre de noix vomique	0 gr. 05
Poudre de rhubarbe	0 — 10
Poudre de quassia	0 — 15
Poudre de colombo	0 — 20

(1) Dans *Gazette Médicale*, Sept 1910, par le Dr André Lombard.