


LIMANDE À QUEUE JAUNE (*Limanda ferruginea*)

Informations générales: On trouve la limande à queue jaune le long du plateau continental à partir du sud du Labrador. Généralement capturée au large en eaux profondes à l'aide de chaluts à panneaux, elle est de couleur brun-olive avec des taches de rouille et possède, comme son nom l'indique, une queue jaune. Elle peut mesurer jusqu'à 40 cm, et pèse habituellement 0,6 kg environ. On l'appelle parfois limande ferrugineuse ou queue jaune.



BROSME (*Brosme brosme*)


Informations générales: Le brosmes, qui est apparenté à la famille des gadidés, est de plus en plus apprécié en Amérique du Nord. Avec son corps allongé, il ressemble beaucoup au merlu, mais se reconnaît à sa nageoire dorsale qui se prolonge jusqu'à la queue. Sa couleur varie en fonction de son environnement, et peut aller du rouge sombre au vert brun ou au jaune pâle. Le brosmes peut peser de 1 à 7 kg et mesure jusqu'à 102 cm. Il s'agit essentiellement d'un poisson nordique d'eau profonde, qui est capturé par les éléments côtiers, précôtiers et hauturiers de la pêche à l'aide de lignes à main, de palangres et de chaluts à panneaux.



Principale saison de pêche: toute l'année, surtout en juin et en juillet.

MERLU ARGENTÉ (*Merluccius bilinearis*)


Informations générales: Le merlu argenté a le corps plus allongé que celui des autres gades, la mâchoire inférieure débordante et la tête mince et pointue. Les adultes capturés mesurent en moyenne de 24 à 35 cm et pèsent en moyenne 0,7 kg. On trouve ce parent de la morue, que l'on appelle parfois merlan, dans les eaux précôtières et hauturières, depuis Terre-Neuve jusqu'à la Caroline du Nord.



Principale saison de pêche: toute l'année, mais surtout de juin à novembre.

MERLUCHE-ÉCUREUIL (*Urophycis chuss*)

Informations générales: La merluche-écureuil appartient à la famille des gades, comme la morue, et joue un rôle économique de plus en plus important après avoir été sous-exploitée pendant des années. Elle se distingue du merlu argenté par la minceur de ses nageoires pelviennes et des dents relativement peu nombreuses. La merluche-écureuil, que l'on appelle aussi parfois lingue, pèse en moyenne de 1 à 5 kg au moment de la capture; on la pêche dans les eaux côtières et précôtières à l'aide de chaluts à panneaux, de palangres et de lignes à main.



Principale saison de pêche: toute l'année, mais surtout de juin à novembre.