

élargi, poli, ponctué. Les écailles alaires blanches avec une tache roussâtre.—Ottawa (Fletcher).

Peut-être certains individus de cette espèce se trouveraient-ils à avoir les segments 2 et 3 de l'abdomen plus ou moins roux.

86. Ichneumon voisin. *Ichneumon vicinus*, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, 169.

♀—Long. .45 pec. Roux, robuste; antennes à articles assez courts, rousses à la base et noirâtres à l'extrémité avec un anneau pâle au milieu. Les côtés du prothorax, les environs de l'écusson, les sutures du métathorax, le dessous avec les hanches postérieures, noir. Ailes subhyalines, les nervures brunes, le stigma fauve. L'écusson jaune plus ou moins roux. Métathorax finement ponctué, les lignes saillantes peu soulevées et formant une aréole en carré longitudinal. Les cuisses postérieures, excepté à la base, avec le sommet de leurs jambes, noir. Abdomen finement ponctué, le post-pétiole finement aciculé, les gastrocèles obliques et peu enfoncés; les segments 3 et 4 avec une ceinture noire à la base; l'extrémité rousse, sans tache.—Ottawa (Harrington).

Rapproché du *seminiger*, mais moins robuste, son post-pétiole plus étroit et sans taches, etc.; dans le *seminiger* le post-pétiole est distinctement aciculé avec une tache pâle de chaque côté au sommet.

87. Ichneumon approchant. *Ichneumon approximans* n. sp.

♂—Long. .55 pec. Noir avec les segments 2 et 3 de l'abdomen jaune-roussâtre, de même que les pattes en partie. Tête et thorax noir sans aucune tache. Ailes hyalines-jaunâtres. Aréole centrale du métathorax en carré transversal. Pattes rousses, toutes les jambes avec l'extrémité des cuisses et les tarses, jaune roussâtre, les jambes postérieures noires à l'extrémité. Abdomen allongé, assez robuste, noir avec les segments 2 et 3 jaune roussâtre, le 2e avec une ligne noire au sommet et le 3e avec une semblable au sommet, une plus petite à la base et souvent une