

La quantité d'eau pour les lavages de la bouche est de une pinte.

Facile à faire chez l'adulte, le lavage exige des précautions chez l'enfant. Le matériel nécessaire consiste dans un réservoir quelconque, muni d'un tube de caoutchouc et d'une canule en os ou en caoutchouc durci, de crainte que l'enfant le brise en se débattant.

L'enfant est tenu sur les genoux d'un aide qui l'entoure de ses bras, lui tient la tête inclinée en avant. L'opérateur introduit la canule de manière à faire arriver le courant derrière les arcades dentaires. Il interrompt de temps en temps le jet, pour permettre à l'enfant de respirer.

Chez les enfants très nerveux, pour éviter une syncope, on s'abstient de faire ces lavages, de même que chez ceux qui souffrent du croup, de crainte de provoquer de la suffocation.

La fréquence de ces lavages, est subordonnée à la gravité de l'angine. Dans les cas graves, i.-e. avec des fausses membranes confluentes et envasissantes, on les fait à toutes les 2 heures.

Les *gargarismes* ont une utilité incontestable. Chez ceux qui sont en état d'en user, Marfan donne la préférence à l'acide phénique à 1 pour 500.

Eau distillée	200 grammes
Glycérine	30 "
Acide phénique neigeux.....	1 "

On conseille aussi *l'eau oxygénée* à 4 pour 100 (soit 2 cuillérées à café dans un grand verre d'eau tiède.)

Pour l'antiseptique nasale, on pourra se servir de la pommade suivante :

a	Vaseline.....	20 grammes
	Acide borique.....	4 "
	Menthol.....	0 gr. 20 cgr.
b	Vaseline.....	20 grammes
	Résorcine	2 "

ou mieux encore des instillations d'huile au menthol ou à l'encalyptol (à $\frac{1}{2}$ pour 100)—d'huile iodée (5 pour 100)—ou de l'huile goménolée.

N.B.—Nul médecin n'ignore qu'il est dangereux de faire des applications de teinture l'Iode ou de vésicatoire sur la peau, de crainte que sur ces surfaces dénudées l'infection diptérique ne s'implante. Par contre on peut appliquer des *compresses chaudes* sur les ganglions douloureux de la région cervicale.

Les *enveloppements froids du thorax* ont une action des plus nettes sur le spasme en cas de croup, ils peuvent supprimer le tirage *intermittent*, mais n'ont aucune influence sur le tirage continu.