

structures délicates que contient la caisse du tympan, nous ferons seulement remarquer ici que plus la suppuration dure longtemps plus la destruction des organes qu'elle contient s'accroît, plus elle devient irrémédiable. De là la nécessité d'intervenir le plus promptement possible afin de conserver intacte l'acuité auditive, ou au moins de prévenir ces surdités complètes qui dans le bas âge entraînent fatalement à leur suite un autre défaut non moins sérieux : la mutité.

En effet, c'est par l'oreille que l'enfant apprend à parler, c'est par là que lui vient l'instruction; plus cet organe est perfectionné, plus il donne d'aptitude à l'avancement intellectuel. Ceci a déjà été démontré d'une manière bien évidente par les statistiques qui ont été faites dans un grand nombre de maisons d'éducation. Que nous prouve l'examen des oreilles des élèves fait indistinctement sur tout le personnel des maisons d'éducation? Deux faits très importants: 1^o qu'il y a une proportion variant de 17 à 25 % des élèves atteints de dysacousie; 2^o que cette proportion de 20 % en moyenne se répartit sur les élèves les moins doués, les derniers de la classe, les distraits, les paresseux et les indociles.

Nous aborderons dans une leçon ultérieure la question du traitement des écoulements de l'oreille et de leurs complications.

Néphrite consécutive à la varicelle, par HÉNOCH, d'après l'*Archivio di patologia infantile*.

Hénoch a publié quatre cas très concluants de néphrite consécutive à la varicelle.

10. Petit garçon de 10 ans, affecté d'une légère néphrite, sans cause appréciable, au printemps de 1883. Quatorze jours auparavant, ce petit garçon avait été atteint de varicelle. Le repos au lit et de petites doses d'acétate de potasse amenèrent une guérison complète.

20. Petite fille de 2 ans, syphilitique, atteinte de varicelle pendant son séjour à l'hôpital; après trois jours, œdème manifeste. L'examen de l'urine révèle la présence de l'albumine, de tubuli et de débris épithéliaux. La malade meurt quinze jours après; à l'autopsie, on trouve de la dilatation et de l'hypertrophie du ventricule droit avec des valvules intactes, de l'œdème pulmonaire, de la néphrite parenchymateuse et un foie gras.

30. Une petite fille de 5 ans, au troisième septénaire d'une fièvre typhoïde, en état de défervescence complète, est prise de varicelle. Huit jours après, il se produit de l'œdème de la face, des pieds et de la vulvite catarrhale. Bains de vapeur. Guérison au bout d'un mois.

40. Petite fille de 4 ans, affectée d'eczéma de la face et de prolapsus du rectum, contracte la varicelle. Onze jours après, elle a une albuminurie considérable, de l'œdème facial, de la pâleur des téguments, une légère fièvre, de la céphalalgie et des douleurs lombaires. Dans les urines, on trouve de nombreux tubuli, des débris épithéliaux et des hématies. Guérison au bout de quinze jours.

La fréquence relative de la néphrite dans la varicelle est donc suffisamment prouvée pour que l'analyse de l'urine s'impose au praticien appelé à soigner cette dermatite infectieuse.—*Revue des maladies de l'enfance*.