

pouvait le toucher. Puis les crises se sont réglées, revenant tous les soirs entre 9 et 11 heures.

Sur la question de monsieur Charcot, demandant si l'enfant ne courait pas? La mère répondit que oui! il courait autour de la table criant: "hop! hop! enlevez les chaises": après sa course il lui arrive de tomber à terre et de se rouler jusqu'à ce que sa douleur étant calmée, il crie! "relevez-moi vite"! d'autres fois, avant sa chute, il crie: "retenez-moi!" et, si on le retient, il ne tombe pas. Dans les deux cas, la voix est changée.

Depuis 3 jours, ses crises ont cessé; mais, il est constamment énervé, capricieux, insupportable; on a du renvoyer sa sœur, il ne veut pas sortir et on a eu toutes les peines du monde à l'amener ce matin à la consultation.

Sur interrogation, l'enfant déclare qu'il a des douleurs tantôt dans un genou, tantôt dans l'autre; que cette douleur lui monte dans le ventre; mais pas plus haut.

L'heure à laquelle surviennent ces crises, indique leur caractère hystérique; quand elles tendent à se régler, c'est le soir qu'elles apparaissent; à l'opposé des crises épileptiques, qui, quand elles se règlent, ont lieu dans la seconde partie de la nuit, tantôt entre une heure et trois heures et tantôt le matin au réveil: ces dernières sont plus rebelles au traitement.

Il y a des enfants qui ont des crises, psychiques impulsives, (coups, grimaces).

Aujourd'hui il tombe de côté et cela dure une minute.

En faisant déshabiller l'enfant, on constate que ses testicules ne sont pas descendus. La question est de savoir si ces crises ne sont pas liées à l'évolution testiculaire incomplète: théorie à laquelle M. Charcot est assez incrédule; car on a attribué à une cause semblable des crises épileptiques; or, les testicules descendus, l'épilepsie persiste. En parcourant les observations, d'épilepsie dites vermineuses, on s'aperçoit que les vers rendus, l'épilepsie continue tout de même.

Il a de l'anesthésie du pharynx et du côté droit de la langue, un très-léger retrécissement du champ visuel. Il n'a pas de point hystérogène.

L'enfant a pris du bromure de potassium; mais, dans l'hystérie, le bromure n'a d'autre influence, que l'effet banal de faire dormir; contre l'hystérie, elle-même, il est de nul effet, c'est le dernier des médicaments.

L'enfant ira prendre tous les matins une douche froide d'une durée de 12 à 15 secondes, la douche sera administrée sur le tronc et les jambes exclusivement; elle sera d'autant plus facile à administrer que le petit malade n'a pas de point hystérogène.