

- 19(14) Écailles avec une carène ou ligne saillante ;
 20(21) Cou sans taches **8. Tropidonotus sirtalis**, VI, p. 354.
 21(20) Cou avec 3 grandes taches blanches
 en arrière. **9. Tropidonatus occipito-maculatus**, VI, p. 360.
 22(1) Corps nu sans carapace ni écailles ;
 23(34) Corps très court ; queue molle ; (ANOURES) ;
 24(33) Mâchoire supérieure dentée ;
 25(30) Doigts peu ou non dilatés aux bouts : RANAÏDES ;
 26(29) Vert plus ou moins foncé ;
 27(28) Deux rangs de grandes taches brunes
 sur le dos **10. Rana halescina**, VII, p. 15.
 28(27) Dos olive à taches très petites ou in-
 distinctes..... **11. Rana pipiens**, VII, p. 19.
 29(26) Rougeâtre, une tache noire près de
 l'œil **12. Rana sylvatica**, VII, p. 17.
 30(25) Doigts très dilatés aux bouts : HYLAIDES ;
 31(32) Doigts palmés ; dents sur le
 vomer **13. Hyla versicolor**, VII, p. 43.
 32(31) Doigts entièrement libres ; dents
 palatines **14. Hylodes Pickeringii**, VII, p. 43.
 33(24) Mâchoire supérieure sans dents :
 BUFONIDES ; **15. Bufo Americanus**, VII, p. 45.
 34(23) Corps allongé, lacertiforme, une queue ; (URODÈLES) ;
 35(42) Cou non troué, avec de simples cicatrices : SALAMANDRIDES ;
 36(39) Dos marqué de taches grandes, isolées, souvent ocellées ;
 37(38) Couleur brun-bleuâtre. **16. Salamandra venenosa**, VII, p. 69.
 38(37) Couleur roux-fauve. **17. Salamandra symmetrica**, VII, p. 69.
 39(36) Dos sans grandes taches isolées ;
 40(41) Une raie rougeâtre sur le milieu
 du dos..... **18. Salamandra erythronota**, VII, p. 70.
 41(40) Dos d'un brun uniforme avec taches mal
 définies, jaunâtres... **19. Salamandra glutinosa**, VII, p. 70.
 42(35) Cou percé de trous pour les branchies qui sont persis-
 tantes : PROTÉIDES **20. Menobranchus lateralis**, VII, p. 71.

(Fin des Reptiles.)